

A gyeptrágyázás elengedhetetlen az egészséges pázsit kialakításához

A gyeptrágyázás néhány arany szabálya

A gyönyörű pázsit minden kerttulajdonos álma. A megfelelően trágyázott gyepterület sötétzöld színű, tömör gyepterület, amely ellenáll a szárazságnak és a fagynak. Van azonban pár egyszerű szabály, amit érdemes követni az eredményesség érdekében.

Miért van szüksége a gyepterületnek tápanyag pótlásra?

A [fűfélék](#) meglehetősen sekélyen gyökereznek a talaj felszínén. Ezért a talaj felső rétegében rendelkezésre álló tápanyagkészlet nagyon gyorsan kimerül, ami hamar meglátszik. A gyepterület ritkább lehet, kiszáradhat vagy megsárgulhat.

És ami számunkra még rosszabb hír, hogy csökken az ellenálló képessége a gyomnövények agresszív terjedésével szemben, amik viszont sokkal jobban tolerálják a rosszabb minőségű talajt is. A gyepterület azáltal, hogy biztosítja a szükséges makrotápanyagokat, hozzásegít a gyepterület a jobb alkalmazkodáshoz. A trágyázás ezért elengedhetetlen az egészséges, sűrű és tömött zöld fűterület kialakításához és fenntartásához.

Erre sem árt figyelni

A trágyázást lehetőleg felhős időben, a fűnyírást követően végezzük el. Ügyeljünk, hogy a gyepterület egyenletesen legyen kiszórva a teljes területen, hogy ne alakuljanak ki foltok a gyepterületen. A körülmények akkor ideálisak, ha a talaj még nedves, de a fűszálak már szárazak, jó alkalom lehet a trágyázást a közelgő eső előtt végezni el. Az előírt mennyiségek betartására ajánlatos figyelni, mert a kelleténél nagyobb mennyiség csökkenti a gyepterület ellenálló képességét, viszont gyakoribb nyírást igényel.

Gyepindító tavaszi trágyázás

A gyepindító trágyázás különösen fontos tavasszal, mivel a nitrogén, ami a gyepterület zöld színéért és intenzív növekedéséért felelős, a téli hónapok során kimosódik a talaj felső rétegéből.

A gyepterület első trágyázását március végén vagy április elején kell végezni, közvetlenül az első fűnyírást követően. A trágyázás megkezdése előtt fontos egyenletesen elterjedtetni a fűterületet, hogy eltávolítsuk a tavalyi elhalt fűszálakat. Ezután érdemes még villával egyenletesen megszórnunk a területet, hogy át tudjon levegőzni. Ilyenkor végezzük el a gyomok eltávolítását is. A művelet után legalább egy hetet ajánlott várni, hogy a fű regenerálódni tudjon, és felkészült legyen az intenzív növekedés időszakára.

A legjobb, ha tavaszi gyepterületet használunk. Ezek [magas nitrogén tartalommal rendelkeznek](#), amik beindítják a gyors és buja növekedést. Ezen kívül számos egyéb elengedhetetlen makroelemet tartalmaznak, mint a foszfor, ami serkenti a gyökérzet fejlődését, és a kálium pedig serkenti a fű növekedését, így ellenállóbb lesz a szárazsággal és a betegségekkel szemben. Olyan egyéb elengedhetetlen mikroelemeket is tartalmaz, mint a magnézium és a kalcium.



Nyári tápanyag-utánpótló trágyázás

A következő gyeptrágyázást ajánlott májusban és júniusban végezni. Ebben az időszakban az a legjobb, ha univerzális gyeptrágyákat használunk. Fontos megjegyezni, hogy aszály és szárazság idején ne trágyázzunk. A legkedvezőbb hatást az eső előtti gyeptrágyázással lehet elérni. A fűszálak közé szórt műtrágya az esővel feloldódik és behatol a gyökerekbe. Ha a közeljövőben nem várható esőzés, úgy a műtrágya szétszórása után az egész gyeplet alaposan meg kell öntözni. Különös gondot kell fordítani a víz egyenletes eloszlására, mert a tápanyagok így tudnak felszívódni a fűszálak teljes területén.

Őszi gyeptrágyázás

Az őszi gyeptrágyát augusztus közepétől október elejéig ajánlott elvégezni, lehetőleg kétszer, a gyártó által megadott mennyiségben. A trágyázás előtt a gyeplet legyen száraz és nyírjuk rövide. A [műtrágya szemcséket](#) egyenletesen terítsük el a teljes gyepfelületen. Ezt a legjobb egy speciális vetőgéppel elvégezni, de ha kézzel szórunk, akkor csináljunk gyors, keresztirányú mozdulatokat. A trágyázás után alaposan öntözzük meg a fűvet.

Az őszi gyeptrágyázáskor, szem előtt kell tartanunk, hogy a nyáron használt univerzális gyeptrágyák sok nitrogént tartalmaznak, amelynek fő feladata, hogy a növényeket növekedésre és kiterjedt zöld tömeg kialakítására ösztönözze. Az őszi időszakban azonban nem a növekedésre, hanem a vegetálásra készül föl a természet. Ezért legkésőbb augusztus első napjaiban abba kell hagynunk az univerzális gyeptrágyázást, különben megzavarjuk a fű természetes fejlődési ciklusát, és megnehezítjük a téli felkészülését, mert a túl sokáig nitrogénnel trágyázott fű fogékonyabb lesz a fagyra és a betegségekre. Az őszi műtrágyában megtalálható foszfor támogatja a növények gyökérzetének növekedését, a kálium pedig hozzájárul a fagy és a betegségek elleni védekezéshez.

PRIMAG
— 1991 —