

Aszályos másodvetés 2026 - mikor vessünk?

Miért lett nehezebb döntés az aszályos másodvetés 2026-ban?

2026 tavasza és nyár eleje rendkívül száraz volt. A HungaroMet elemzései szerint júliusra a talaj felső 1 méterében országosan 100-125 mm víz hiányzott a telítettséghez képest, a felső 20-30 cm sok térségben porzott. Nem az a kérdés, hogy lehet-e másodvetni, hanem az, hogy van-e reális esély egyenletes kelésre és zavartalan kezdeti fejlődésre. A következő fejezetekben gyakorlati kapaszkodókat adunk a vetés időzítéséhez, a halasztás indokaihoz, a növényválasztáshoz és az adminisztratív megfeleléshez. A PRIMAG kínálatában elérhető szántóföldi vetőmagok, kerti vetőmagok, zöldtrágya és takarónövény megoldások közül is mutatunk irányokat.

Mit jelent az aszályos másodvetés a gyakorlatban?

Másodvetésnek a főnövény betakarítása után vetett kultúrát nevezzük. Két célirányt érdemes külön kezelni. A terméscélú másodvetés nagyobb vízkockázat mellett fut, mert a hiányzó zápor vagy hosszan tartó hőség gyorsan elviszi a kelést vagy visszaveti a kezdeti fejlődést. A talajvédelmi, takarási vagy [zöldtrágya](#) célú másodvetés ezzel szemben kisebb hozambeli elvárással, de stabilabb agronómiai indokkal működik: a talaj fedése, a gyomosodás visszafogása, a szerkezet és a szervesanyag-növelés a fő hozadék.

A döntésnél támaszkodhatsz a PRIMAG portfóliójára: szántóföldi vetőmagok a takarónövényként is bevált fajokkal, kerti vetőmagok a rövid tenyészidejű zöldségekkel, és célzott zöldtrágya- és takarónövény keverékek a talajállapot javításához.

Mikor érdemes vetni aszályos másodvetésnél?

Alapszabály: a főnövény lekerülése után minél előbb, de csak akkor, ha a felső talajrétegben ténylegesen van nedvesség, és a vetőágy-készítés nem szárítja tovább a területet. A gyors döntés agronómiai okból is számít, hiszen minden nyitott nap párolgási veszteség, és adminisztratív okból is, mert az AÖP- és másodvetési határidők szűkek. A hazai ablak jellemzően július eleje és augusztus közepe. Aszályban ez csak akkor működik, ha a felső 5-10 cm-ben van felvehető víz, és előny, ha a vetés után rövid időn belül csapadék várható.



Milyen feltételek mellett van értelme gyorsan vetni?

A felső talajréteg ne legyen poros és rögös, hanem enyhén nedves, kézzel gyúrható. A vetőágy-készítést minimalista szemlélettel érdemes megoldani: sekély, célzott művelet, amely inkább zár, mint nyit, és nem hozza fel a nedves réteget. A választott kultúra legyen rövid tenyészidejű és gyors kezdeti fejlődésű. A cél ne feltétlenül a nagy hozam legyen, hanem talajtakarás, zöldsötömeg vagy szerkezeti javítás. Ilyen körülmények között a keverékekkel vetett zöldtrágyák és takarónövények eleve nagyobb toleranciát adnak.

Mikor számít jó döntésnek a korai másodvetés?

Ha a tarló lekerülése után még van megőrizhető nedvesség, és azt a vetőágy-készítés nem égeti el. Ha a tervezett növény illeszkedik a szűk időablakhoz, és a gazdaság elsődleges célja a talaj fedése, a gyomosodás visszafogása és a szervesanyag-építés. Olyan másodvetésre ajánlott vetőmagokkal érdemes dolgozni, amelyek gyorsan záródnak és jól viselik a nyári stresszt.

Mikor célszerű halasztani az aszályos másodvetést?

Nem minden tábla alkalmas azonnali vetésre, még akkor sem, ha a naptár szerint itt az idő. Ha a kelés esélye túl alacsony, a halasztás racionális döntés lehet.

Azok a jelek, amikor a vetés kockázata túl magas

- A felső 5-10 cm-es réteg teljesen száraz, poros, rögzös.
- A következő napokban nincs érdemi csapadék a kilátásban.
- A főnövény későn kerül le, a másodvetés nem teljesítené a 60 napos fenntartási időt.
- A kiszemelt növény tenyészideje túl hosszú az adott időponthoz képest.

Miért lehet drága hiba a túl korai, nedvesség nélküli vetés?

Egyenetlen vagy elmaradó keléshez vezet, felesleges költséget és plusz menetszámot okoz. A hiányos talajfedés erősebb gyomosodást hagy maga után, és adminisztratív kockázat is, ha a vállalt másodvetés végül nem teljesíti a fenntartási feltételeket.

Milyen növényeket válasszunk aszályos másodvetésre?

Három szűrő segít: rövid tenyészidő, gyors kezdeti fejlődés, és illeszkedés a termesztési célhoz. Ha a termés a cél, akkor is kulcs, hogy vetéskor legyen víz a felső rétegben, és a vetést kövesse csapadék. Talajvédelmi cél esetén a több fajból összeállított zöldtrágya- vagy takarónövény-keverékek adják a legstabilabb eredményt.

Termesztési cél	Előny	Kockázat aszályban	Mikor válaszd
Terméscélú másodvetés	Piacképes termés rövid ciklusban	Magas, a kelés könnyen sérül vízhiányban	Ha van nedvesség a felső rétegben és csapadék kilátásban
Talajvédelmi, zöldtrágya	Gyors talajfedés, biomassa, szerkezetjavítás	Kisebb, nincs hozamkényszer	Száraz évben általában ez a biztosabb irány

Terméscélú másodvetésre szóba jöhető növények

- csemegekukorica, spenót, cékla, bokorbab, zöldbab, uborka, fejes saláta, endívia, retek, rukkola, tépősaláta

Talajvédelmi célra a PRIMAG zöldtrágya- és takarónövény-keverékei több faj kombinációjára építenek, eltérő gyökérmélységgel és gyors záródással. A pillangósok szerepe itt kiemelt a nitrogén-kötés miatt.

Talajnedvesség-megőrzés másodvetés előtt és után

Aszályos körülmények között a siker egyik feltétele a vízmegőrzés. A túlzott talajmozgatás gyorsítja a párolgást, a nedvesebb réteget felhossa és kiszáraitja. Konzerváló, minimális művelés, tarló és felszíni mulcs segít a maradék nedvesség megőrzésében. A szecskázott szármaradvány árnyékol,

véd a szél szárító hatásától, és mérsékli a hőingást.

Mit segíthet a tarlókezelés és a talajtakarás?

A tarlómaradványok csökkentik a párolgást és a cserepesedést, így a következő csapadék könnyebben hatol a mélyebb rétegekbe. A takarónövények folyamatosan fedik a talajt, élő gyökérrel tartják aktívan a talajéletet és visszafogják a gyomokat. A PRIMAG portfóliójában találsz tarlóba vethető keverékeket és klasszikus zöldtrágyákat is.

Milyen céllal érdemes zöldtrágyát vetni száraz évben?

Elsősorban a talaj fedésére, a gyomosodási nyomás mérséklésére és a következő kultúra számára kedvezőbb talajállapot előkészítésére. A jól megválasztott keverékek egyszerre szolgálják a termékenységet és a támogatási megfelelést, miközben kevésbé érzékenyek a hozamingadozásra.

Milyen adminisztratív határidőkre kell figyelni 2026-ban?

A másodvetés bejelentési kérdés is. Ökológiai jelentőségű másodvetésként a vetést tárgyév október 1-ig kell elvégezni, legalább két fajból álló keverékkel, és a kultúrát minimum 60 napig a területen kell tartani. A talajba dolgozás vagy a területen tartás időzítése is számít. Aszály miatti vis maior bejelentés 21 napon belül tehető meg, de másodvetésre ezt jellemzően csak kivételes esetben fogadják el. A konkrét AÖP- és KAP-feltételeket mindig az aktuális hivatalos tájékoztatásokban ellenőrizd.

Mikor okoz gondot a késői betakarítás?

Ha már nem fér bele a 60 napos fenntartási idő, vagy az október 1-i vetési határidő. Ha a vetés annyira kitolódik, hogy a rövid tenészszerű fajok sem indulnak biztonságosan az őszi lehűlés előtt. Ilyenkor célszerű a mennyiségi cél helyett talajvédelmi célt választani, és a következő fővetés érdekét előtérbe tenni.

Gyakorlati döntési séma - vetni vagy halasztani?

Először nézd meg, van-e használható nedvesség a felső rétegben. Ha igen, mérlegeld, várható-e csapadék 3-7 napon belül. Rövid tenészszerű vagy takarási célú növényrel nő az esély a sikerre. Ellenőrizd, hogy a bejelentési és fenntartási szabályokat teljesíteni tudod-e. Ha bármelyik pont nem áll, a halasztás vagy a cél újragondolása lehet a jobb irány.

Milyen PRIMAG termékkörök jöhetnek szóba aszályos másodvetéshez?

[Szántóföldi vetőmagok](#) talajvédelmi és másodvetési célra, kerti vetőmagok a rövid tenészszerű [zöltségfélékhez](#), valamint zöldtrágya és takarónövény vetőmagok a biztos talajfedéshez. A PRIMAG szakmai tudásbázisa és termesztési tanácsai segítenek a faj- és keverékválasztásban, a vetési időzítésben és az adminisztratív megfelelésben.

Mikor racionális döntés az aszályos másodvetés?

A siker kulcsa nem a naptár, hanem a nedvesség megléte, a gyors reakció és a jó növényválasztás együtt. Száraz évben a talajvédelmi célú másodvetés többnyire biztonságosabb, mint a termésre alapozott próbálkozás. Ha másodvetésben gondolkodsz, válogass a PRIMAG zöldtrágya- és takarónövény megoldásai, illetve a rövid tenészszerű kerti vetőmagok közül, és egyeztesd a vetést az AÖP- és vis maior szabályokkal.

GYIK

- **Meddig számít időben elvégzettnek a másodvetés?**

Ökológiai jelentőségű másodvetésnél a vetést október 1-ig kell elvégezni, és a kultúrát legalább 60 napig a területen kell tartani. Terméscélú másodvetésnél az agronómiai ablak a főnövény lekerülése utáni július eleje, augusztus közepe, de aszályban a tényleges talajnedvesség felülírja a naptárt.

- **Mi alapján dönthető el, hogy aszályban érdemes-e egyáltalán vetni?**

Két tényező együtt döntsön: legyen használható nedvesség a felső 5-10 cm-ben, és mutasson esélyt a vetés utáni csapadék. Ehhez add hozzá a választott növény tenyészidejét és azt, hogy az AÖP-bejelentés és a 60 napos fenntartási idő teljesíthető-e. Ha bármelyik hiányzik, a halasztás és a talajvédelmi irány lehet a jobb döntés.

- **Milyen növények alkalmasak rövid tenyészidejű másodvetésre?**

Rövid ciklusú zöldségek, mint a retek, saláták, rukkola, spenót, zöldbab, bokorbab, valamint korai csemegekukorica hibridek és egyes uborkafajták. Talajvédelmi célra fehér mustár, olajretek, köles, szudánifű és pillangósokat tartalmazó zöldtrágya-keverékek javasoltak.

- **Mikor jobb választás a zöldtrágya, mint a terméscélú másodvetés?**

Szélsőséges aszályban, amikor a kelés bizonytalan és a kockázat magas. Akkor is, ha már szűk az idő az értékes terméshez, de a 60 napos fenntartás és a talaj fedése még teljesíthető. Ilyenkor a biomassza, a gyomelnyomás és a talajszerkezet-javítás kézzelfoghatóbb eredményt ad.

- **Milyen hibák okozzák a leggyakrabban a másodvetés sikertelenségét száraz évben?**

Vetés teljesen száraz talajba csapadék nélkül, túlzott talajmozgatás, ami elpárologtatja a maradék vizet, a valósnál hosszabb tenyészidejű faj választása, valamint az adminisztratív szabályok (október 1, 60 nap, fajösszetétel) figyelmen kívül hagyása.