

## Bíborhere

A [bíborhere](#) egyéves áttelelő, pillangósvirágú szálás takarmánynövény, amely csapadékosabb viszonyok között olyan talajokon is termesztendő, ahol a lucerna és a vöröshere már nem díszlik. A bíborhere gyors fejlődésű, rövid tenyészidejű növény, kora tavasszal kaszálható, ezért utána még másodnövények is termesztendők. A többi pillangósokhoz hasonlóan kiváló talajjavító növény, amely zöldtrágyázásra is felhasználható.



A bíborheréből - a növény szőrözöttsége miatt - jó minőségű széna nem készíthető, ezért csak magtermesztésre és zöldtakarmányozás céljára termesztjük. Zöldtakarmányként minden állat szívesen fogyasztja. Nagyon jó magtermesztés céljára termesztjük. Magja keresett exportcikk.

### • Rendszertan és biológiai jellemzés

A bíborhere (*Trifolium incarnatum* L.) a herefélék (*Trifolium*) nemzetségéhez tartozik. Gyökérzete mélyreható, dúsan elágazó karógyökér. Szára 50-60 cm magas, dudvászár. Levélzete hármasan összetett (trifolium-levél). Virágzata hosszúkás, kissé elkeskenyedő, hengeralakú, tömött fűtvirágzat. Színe bíborvörös. Idegen termékenyülő, de öntermékenyülés is lehetséges. Termése egymagvú hüvely. A mag tojásalakú, színe sárgásbarna. Ezermagtömege 2,5-3,6 g.

### • Éghajlat, talajigény és vetésváltás

A bíborhere a kiegyenlítettebb, csapadékban gazdag éghajlat növénye. A szárazságot, valamint a hótakaró nélküli, hideg telet nehezen tűri. A talajjal szemben igénytelen növény, még a talajok mélyrétegeire sem igényes. A gyengén savanyú, közömbös és enyhén meszes, könnyen művelhető talajokat kedveli. Hazánkban főleg a Dunántúl csapadékosabb nyugati és észak-nyugati részein termesztjük. A bíborhere az előveteményekre sem kényes. Rendszerint gabonafélék után vetjük. A bíborhere nagyon jó elővetemény, utána bármilyen növény következhet. Még másodnövények is vethetők a bíborhere után.

### • Tápanyagigény és trágyázás

Megegyezik az igénytelen [pillangósok](#) trágyázásával (főleg foszfort és káliumot igényel).

### • Talajelőkészítés

Azonos a többi pillangós takarmányokéval, de a nyárvégi vetés miatt fokozott gondosságot igényel.

### • Vetés és ápolás

A bíborherét augusztus közepén, végén, gabonaszüszűk után vetjük. A vetésmélység kb. 2-3 cm. (Vetőmagszükséglete 30-35 kg/ha.) Ápolása: ősszel, ha nagyon buja, óvatosan legeltessük; ha felfagyott, tavasszal hengerezzük le. Ápolás. Felfagyás esetén kizöldülés előtt hengerezzük. Betegségei a gyökérfekély és a fertőző hervadás, kártevői pedig a májusi cserebogár és a vetési bagoly. (A vöröshere valamennyi betegsége és kártevője is megtámadhatja).

### • Betakarítás

A bíborhere csak egyszer - május elején, közepén - kaszálható. Teljes virágzásban szára nagyon elfásodik, ezért [zöldtakarmánynak](#) csak a virágzás megindulásáig alkalmas. Amit nem tudunk zölden feltakarmányozni, hagyjuk meg magnak, vagy készítsünk belőle silótakarmányt. Zöldtermése 1-1,2 t/ha.

Forrás: Szántóföldi növénytermesztés tan



P R I M A G

— 1991 —