

Kalászosok: így lesz erős a kelés és bokrosodás

Mit tehetünk a kalászosok erős keléséért és bokrosodásáért?

A kalászosok termésszintje már a vetés előtt és a kelést követő hetekben eldől. A kalászosodás nem egyetlen fenológiai pillanat, hanem csírázástól a kalászosodásig tartó folyamat. Ezen belül a kelés és az őszi bokrosodás a legérzékenyebb szakaszok, ekkor alapozzuk meg a gyökérzet erejét és a termékeny oldalhajtások számát. Az alábbiakban végigvesszük, milyen technológiai döntések adják a legnagyobb esélyt az egyöntetű kelésre, az erős gyökérzetre és a több életképes hajtásra.

Mit jelent a kalászosodás a gyakorlatban?

A köznyelvi kalászosodás több egymásra épülő lépést foglal magába. A csírázás során a mag vizet vesz fel, megindul a gyököcske és a csírahajtás. A keléskor áttöri a felszínt, majd beindul az önálló asszimiláció. A bokrosodás szakaszában a főhajtás mellett oldalhajtások és másodlagos gyökerek fejlődnek. Ezt követi a szárba indulás, végül a kalászosodás és a virágzás. A bokrosodás határozza meg döntően, mennyi termékeny kalász marad meg a betakarításig, hiszen a korán megjelenő oldalhajtások közül nem mindből lesz termő hajtás. A környezeti feltételek és a technológia ezért már ősszel szelektálnak.

Miért ezen múlik a terméspotenciál már ősszel?

Az egyenetlen kelés eltérő fejlettséget és hézagos záródást okoz, növeli a gyomnyomást és rontja a tél előtti kondíciót. A gyenge bokrosodás tavasszal csak részben pótolható, mert a vízért, tápanyagért és fényért folytatott konkurencia már magas. Jó eredményt az ad, ha a vetőmag, a fajta, a vetésidő, a magágy, a vetésmélység és a tápanyagellátás egy irányba húz.

Jó indulás vetőmaggal kezdődik

- **Egészséges és erős vetőmag szerepe**

Az egyöntetű kelés alapja a magas csírázóképeség, a jó vigor és a fajtaazonosság. A gyengébb tételek lassabban kelnek, hiányosabb állományt és már induláskor fejlettségbeli különbségeket okozhatnak. Vetés előtt érdemes ellenőrizni a csírázást, az ezermagtömeget, a csávázást és a tétel tárolási körülményeit. A Primag fémzárolt, ellenőrzött kalászos vetőmagjai stabil alapot adnak az egyöntetű keléshez.

- **Fajtakiválasztás a termőhelyhez igazítva**

Nem csak a maximális termőképesség számít. Fontos a talajtípushoz és a csapadékhoz való illeszkedés, a bokrosodási erély, a télállóság, a szárszilárdság és a betegség-ellenállóság. Későbbi vetésnél és hűvös őszen külön előny a gyors kezdeti fejlődés és a jó bokrosodási képesség. A Primag választékában az [őszi búzától](#) az [őszi árpán](#) át a [tritikáléig](#) több genetikára találsz megoldást.

A vetésidő hatása a kelésre és a bokrosodásra

Vetésidő	Előny	Kockázat	Technológiai válasz
Túl korai	Hosszabb őszi fejlődés	Túlfejllett páras magasabb betegségrizikó, gyengébb nitrogéntuladag esetén	állomány, Mérsékelt őszi N, mikroklima, erősebb növényvédelem, kiegyensúlyozott állománysűrűség
Túl késői	Kisebb őszi növekedés, alacsonyabb fertőzésigyekecs nyomás	Kevesebb gyökeresedésre bokrosodásra, állomány, tavaszi indulás	időKissé emelt és vetőmagnorma, ritkább apró morzsás magágy, gyengébb gyors gyomelnyomás
Optimális	Elegendő bokrosodás gyökeresedés	őszildőjárásfüggő és	Fajtaspecifikus időzítés, talajnedvesség és hőmérséklet figyelése

A hazai gyakorlatban az őszi búza vetése többnyire szeptember vége és október közepe között ideális. A döntést ne naptár alapján hozd meg, hanem az elővetemény felszabadulása, a talajnedvesség, a fajta fejlődési dinamikája és a várható őszi időjárás alapján. A jól időzített vetés gyors talajfedést és jobb gyomelnyomást ad.

Magágy és vetésminőség: itt dől el az egyöntetű kelés

A jó magágy apró morzsás, ülepedett, de nem tömörödött. Lényeges a jó mag-talaj kapcsolat és egyenletes vízellátás. A rögös felszín, a levegős vetőágy, a tömör talpréteg vagy a sekély, egyenetlen talajmunka foltszerű, vontatott kelést okozhat. A vetésmélység általában 4-6 cm. A túl mély vetés lassítja a kelést és gyengíti a kezdeti fejlődést, a túl sekély növeli a kiszáradás és a kifagyás kockázatát. Állítsd a vetőgépet a táblarészek szerint, ne ragaszkodj merev centiméterekhez.

Vetési norma: nem minden táblán ugyanaz működik

A helyes norma a kívánt kelő növény számból indul ki, amit a fajta bokrosodási ereje, az ezermagtömeg, a csírázókéesség, a vetésidő, a talajtípus és a várható téli veszteség szerint érdemes kalkulálni. Intenzív fajtáknál gyakori a 5,5-6,2 millió csíra/ha célszám, ami tipikus magméret mellett 200-260 kg/ha körüli vetőmagot jelenthet. Más esetekben 250-320 kg/ha is indokolt, de bokrosodó fajtán, jó körülmények között 150-180 kg/ha is elegendő lehet. A túl sűrű állomány fokozza a versenyt, a megdőlést és a betegségeket, a túl ritka pedig a gyomokat és a gyenge kalászszaot erősíti. A Primag szakértői a kiválasztott fajta és termőhely alapján segítenek célzott normát számolni.

Tápanyagellátás az erős kezdeti fejlődésért

A bokrosodás nem csak nitrogénkérdés. A foszfor a gyökérfejlődés motorja, hideg talajon könnyen korlátos. A kálium a vízháztartást és a télállóságot támogatja. A nitrogén a hajtásfejlődést gyorsítja, de ősszel csak annyi jusson ki, amennyit a növény biztosan hasznosít. A kén a N-hasznosuláshoz kapcsolódik, a mangán, réz, cink vagy magnézium hiánya pedig gyengítheti a kondíciót. Talajvizsgálatra építve tervezz, ne sablonnal. A Primag műtrágya kínálata a foszfor-, kálium- és nitrogénellátás több megoldását is lefedi, talaj- és termésszint célokhoz igazíthatóan.

A gyomok mint konkurencia: a bokrosodás csendes visszafogója

A gyomok pont akkor veszik el a vizet, a tápanyagot és a fényt, amikor a kalászos gyökere és

oldalhajtasai alapoznak. Késői vetésnél vagy ritkább állománynál ez különösen fáj. Ilyenkor az őszi gyomirtás megtérülő beavatkozás, főleg ha korán kelő egyszikűek, veronikák, tyúkhúr vagy kamillafélék dominálnak. A kezelést a gyomösszetételhez, a kultúra fejlettségéhez és az engedélyokiratokhoz igazítsd.

A gyökérzet fejlődése: a bokrosodás alapja a talajban van

Erős másodlagos gyökérzet nélkül nincs stabil bokrosodás. A jó szerkezetű, ülepedett magágy, a biztos foszforellátás, a kiegyensúlyozott kálium és a mértékletes N segíti a gyökérképződést. Visszafogó tényező a tömörödés, a szárazság vagy a vízzel telítettség, a foszforhiány, a rossz magágy és a gyomnyomás. Ha a növények rövid, elágazás nélküli gyökérrel, lassú levélfejlődéssel jelzik a gondot, először a talajszerkezetet és a tápanyag-ellátottságot vizsgáld, a [lombtrágya](#) ilyenkor csak kiegészítés lehet.

Tavaszi állományfelmérés és célzott beavatkozás

Tél után mérd fel a tőszámot, az oldalhajtasok számát, a fejlettség homogenitását és a gyökérzet állapotát, keresd a kifagyás és kipállás nyomait. A fejtrágyázás akkor segít, ha az állomány halvány, kevés az életképes oldalhajtás és alacsony a talaj N-ellátottsága. Az első adag időzítését a fejlődési állapothoz, csapadékhöz és várható termésszinthez igazítsd. Lombtrágya és növénykondicionáló kezelést igazolt hiány, hideg, vízstressz vagy átmeneti gyökérgátlás esetén érdemes beiktatni, de ez a talajon keresztüli ellátást nem váltja ki.

Mikroelem-kiegészítés csak valós igény esetén

Kalászosokban leggyakrabban a mangán, a réz és a cink hiánya okoz gondot, bizonyos helyzetekben a magnézium és a bór is limitáló lehet. Beavatkozást talaj- és levélanalízis, jellegzetes tünettan és ismert kockázat együtt indokoljon, mert a hideg, a szárazság vagy a tömörödés hasonló levéltüneteket adhat. A Primag lombtrágya és mikroelem kínálata célzottan illeszthető a hiányok rendezéséhez.

Gyakorlati ellenőrzőlista a termesztés fő pontjaihoz

- Vetés előtt: ellenőrizd a vetőmag csírázókéességét és ezermagtömegét, válassz termőhelyre illeszkedő fajtát, rendeld meg az alaptrágyát talajvizsgálat alapján, ütemezd a vetésidőt és számold ki a vetőmagnormát.
- Vetéskor: tartsd az egyenletes mélységet és a jó mag-talaj kapcsolatot, ügyelj a nyirkos, de nem túl nedves magágyra, igazítsd a vetőgép beállítását a táblarészekhez.
- Kelés után: nézd az egyöntetűséget és a gyomosodást, ha kell, időzíts őszi gyomirtást, figyeld a korai tápanyaghiány és a vírusvektorok jeleit.
- Tavaszi induláskor: állományfelmérés alapján dönts a fejtrágyázás adagjáról és időzítéséről, indokolt esetben tervezz lombtrágyát vagy kondicionálót.

Erős kelés és bokrosodás akkor lesz, ha a vetőmag minősége, a fajta, az időzített vetés, az aprómorzsás magágy, a számolt vetőmagnorma, a talajvizsgálatra épített tápanyagellátás és a korai gyomvédelem egymást erősíti. A Primag komplett megoldásokat kínál ehhez a lánchoz a kalászos vetőmagtól a műtrágyákon és lombtrágyákon át a növényvédő szerekig, szaktanácsadással és országos logisztikával.

GYIK

- **Mit jelent pontosan a kalászosodás?**

A kalászosodás a csírázástól a kelésen és bokrosodáson át a szárba indulásig és a kalászolásig tartó fejlődési ív. A terméspotenciált leginkább a kelés utáni hetek és az őszi bokrosodás alapozzák meg, mert ekkor dől el a kalászosok nagy része.

- **Mikor a legjobb elvetni az őszi kalászosokat az erős bokrosodásért?**

Általános támpont az őszi búzánál a szeptember vége és október közepe közötti időszak, de a döntést az elővetemény, a talajnedvesség, a fajta fejlődési erélye és a várható időjárás alapján hozd meg. A cél egy jól fejlett, de nem buja állomány, amely a tél előtt már megerősödött gyökérrel és néhány életképes oldalhajtással rendelkezik.

- **Milyen vetőmagnorma segítheti a megfelelő állománysűrűséget?**

A normát a kívánt kelő növény számból számold, és igazítsd az ezermagtömeghez, a csírázóképeséghez, a vetésidőhöz és a fajta bokrosodási erejéhez. Gyakori cél az 5-6 millió csíra/ha sáv, ami sok fajtánál 200-260 kg/ha körüli mennyiséget jelent, de eltérhet a körülményektől függően.

- **Miért gyengülhet a bokrosodás még jó kelés mellett is?**

Ok lehet a tömörödött talaj, a foszforszegény magágy, a túlzott vagy éppen hiányos őszi nitrogén, a gyomkonkurencia, a vízhiány vagy a vízborítás, illetve a kártevők és vírusok jelenléte. Ilyenkor a talajszerkezet, a tápanyagellátás és a növényvédelem összehangolt korrekciója hoz eredményt.

- **Mikor indokolt az őszi gyomirtás a kalászosokban?**

Ha a táblán korán kelő, erős konkurenciát adó fajok jelennek meg, ha a vetés késői vagy ritkább, illetve ha csökkentett vetőmagnormát alkalmazol. A kezelést mindig a gyomösszetételhez és a kultúra fejlettségéhez igazítsd, az engedélyokirat szerint.

Források

AHDB – Establishment in wheat: germination and emergence (GS0-GS2)

<https://ahdb.org.uk/knowledge-library/establishment-in-wheat-germination-and-emergence-gs0-gs2>

AHDB – Wheat Growth Guide

<https://ahdb.org.uk/knowledge-library/wheat-growth-guide>

FAO – Wheat growth and physiology

<https://www.fao.org/4/y4011e/y4011e06.htm>

FAO – Zadoks growth stages of wheat

<https://www.fao.org/4/X8234E/x8234e05.htm>

AHDB – Sowing winter wheat late: Understanding the risks

<https://ahdb.org.uk/news/sowing-winter-wheat-late-understanding-the-risks>

AHDB – Winter wheat recommended and candidate lists

<https://ahdb.org.uk/knowledge-library/winter-wheat-recommended-and-candidate-lists>

FAO – Irrigated Wheat: Managing Your Crop

<https://www.fao.org/4/x8234e/x8234e00.htm>



P R I M A G

— 1 9 9 1 —