Fitohorm Eco Bór

Ajánlás: növénykondícionáló

Dózis: 1-3 l/ha

Kultúra: univerzális

Státusz: Rendelhető

Az olajnövények teljes virágzás előtti időszakában ajánlott kijuttatni. Segítségével a sejtosztódást tudjuk stimulálni, megerősítjük a virágszerveket és megnöveljük a megtermékenyült virágok számát, lecsökkentjük a léha magvak mennyiségét. Kedvezőtlen körülmények között használatával erősíthetjük a növények fotoszintetikus aktivitását. A nitrogén megerősíti a szárat, serkenti az (oldal)hajtások kifejlődését. A bórnak elsősorban a virágzásbiológiai és termékenyülési folyamatokban van nagyon fontos szerepe. A bór részt vesz a hajtáscsúcs fejlődésében, a magkötésben és a szénhidrátok anyagcseréjében. Csekély molibdén ellátottság esetén a növények klorofiltartalma csökken, fotoszintézisük gátolttá válik, a generatív fejlődési szakaszban zavarok keletkeznek. Hiánya pillangósok esetében a nitrogénhiányra jellemző tünetekkel társul, aminek a hátterében a velük szimbiózisban élő gümőbaktériumok jelentős molibdén igénye áll.

Alkalmazásának előnyei:

- gazdaságos bórtrágya kiváló minőségben
- kedvezőtlen körülmények között használatával erősíthetjük a növények fotoszintetikus aktivitását
- használatával megerősítjük a virágszerveket és megnöveljük a megtermékenyült virágok számát, lecsökkentjük a léha magvak mennyisségét
- látványos hatás UAN oldatokkal keverve is

Felhasználási javaslat:

- Szántóföldi levéltrágyázásra: 2-3 l/ha/alkalom
- Kertészeti, házikerti 1-2 %-os töménységben (1-2 dl/10 l víz)

Figyelem!
A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.
Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasol-juk megvizsgálni. Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.
A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!
Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.