

Fitohorm 24 Mg

Ajánlás: növénykondicionáló

Kultúra: univerzális

Státusz: Rendelhető



PRIMAG

Hazai talajaink magnéziumtartalma általában kielégítő, hiánya mégis meg-megjelenik. Ennek hátterében legtöbbször a talajban mellette lévő ún. antagonistá tápelemek (kálium-, réz-, mangán-, ammóniumion) túlsúlya áll. Hiánya először az idősebb leveken jelentkezik, a levelek kivilágosodnak, majd, sárgulnak, a klorofill csak a levél ereken marad meg. A károsodott levelek korán lehullnak, hatására a gyümölcsfák felkopaszodnak.

EK-műtrágya

Kelátképző: EDDHSA

Felhasználási javaslat:

A FitoHorm palettáján a monoelemes készítmények körében megtalálhatjuk a FitoHorm 24 Mg magnéziumtrágyát, mellyel a jelentkező hiánytünetek könnyűszerrel orvosolhatók, de a hangsúly mégis a megelőzésen van. Különösen nagy jelentőséggel bír a napraforgó, búza és a gyümölcskultúrák termesztésében. A levélanalízis erre kiváló megoldást jelenthet, mely alapján megelőzhetjük a problémát.

- levéltrágyázásra: 5-10 l/ha/alkalom, házikertben 1-2 %-os töménységben (1-2 dl/10 l víz)
- tápoldatozásra: 0,1-0,5 %-os töménységben (1-5 l /1000 l víz)

A kezeléseket a tápanyaghiány mértékének megfelelően 2-6 alkalommal ismételni lehet a tenyészidőszak folyamán.

Összetétel:

- MgO: 6,6 % (max)
- So₃: 10,6 % (max)

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.



PRIMAG
— 1991 —

Figyelem!

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait!

Növényvédő szerekkel együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk megvizsgálni!

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését!

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni!



P R I M A G
— 1991 —