

Fitohorm MikroMax

Ajánlás: növénykondicionáló

BIO: BIO

Kultúra: szőlő/gyümölcs/zöldség

Státusz: Rendelhető

Ökológia gazdálkodásban is felhasználható készítmény!



A MIKROMAX a növények „Béres cseppje”, egy igazi immunrendszert erősítő „mikroelem-bomba”.

Az új fejlesztésű termékeink sorában a makrotápelemek (N, P, K) nélkülözésével kizárólag a harmonikus mikroelem ellátást céloztuk meg (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Mint a neve is mutatja, azokat a lehető legnagyobb mennyiségben, a növények számára megfelelő arányban tartalmazza.

PRIMAG
— 1991 —

Levélen keresztül alkalmazható szántóföldön, szőlő- és gyümölcskultúrákban egyaránt.

EK-műtrágya

Kelátképző: EDDHSA

Összetétel (m/v %):

- Fe: 3
- Mn: 1,32
- Cu: 0,15
- Zn: 0,23
- B: 0,26
- Mo: 0,07



ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI:

PRIMAG
— 1991 —

- Kertészeti kultúráknál és dísznövényeknél talajkezelésre, tápoldatozásra és lombtrágyázásra egyaránt használható,
- palántázás és ültetés előtt vagy után is alkalmazható,
- ökológiai termesztésben is engedélyezett,
- szántóföldi kultúrákban az egész tenyészidőszakban felhasználható,
- ár/érték arányban a legjobb választás a magyar lombtrágya piacon.

Felhasználási javaslat:

Szőlő, olíva, citrusfélék:

Dózis l/ha kezelésenként: 2,0-2,5

Felhasználási mód: 3-4 kezelés bogyóképződéstől, betakarításig + 1 kezelés szüret után

Gyümölcs, bogyósok, kiwi:

Dózis l/ha kezelésenként: 1,5-2,0

Felhasználási mód: 3-4 kezelés bogyóképződéstől, betakarításig + 1 kezelés szüret után

Körte:

Dózis l/ha kezelésenként: 1,0-1,5

Felhasználási mód: 3-4 kezelés gyümölcsképződéstől szüretig + 1 kezelés dupla dózisban szüret után

Őszi, tavaszi kalászosok, rizs:

Dózis l/ha kezelésenként: 2,0-2,5

Felhasználási mód: 1 kezelés bokrosodás vége-kalászás közötti fenológiai stádiumban

Zöldségfélék, dísznövények, díszfák, díszcserjék:

Felhasználási mód: csak talajkezelésre 3-5 ml/m² (3 ml/1 l víz)

Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk megvizsgálni.



Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.

Figyelem!

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.



PRIMAG
— 1991 —