

Fitohorm Turbo Nitrogén

Státusz: ajánlatkérés

Termék neve: Fitohorm Turbo Nitrogén

Összetétel: N30 MgO 3 SO3 6,5

Dózis: 10-15 l/ha

Ajánlás: univerzális

A különböző nitrogénformáknak köszönhetően a növény folyamatos (levélen keresztül történő) nitrogénellátása biztosított.

A kijuttatást követően a nitrogén felszívódást a karbamid forma garantálja, míg az ureaformaldehid komponens kémia tulajdonságainak köszönhetően fokozatos és egyenletes tápanyagellátást eredményez több héten keresztül.

A formaldehydes kivitelnek köszönhetően a növények megperzselődésének veszélye rendkívül alacsony.

A Fitohorm Turbo Nitrogén egy kelátképzővel ellátott karbamid, ureaformaldehid forrású EK-műtrágya oldat hozzáadott rézzel, kénnel és magnéziummal, mely lombtrágyaként minden növényi kultúrában (pl.: búza, árpa, egyéb kalászosok, kukorica, burgonya, repce, napraforgó, egyéb olajnövények, cukorrépa, szőlő és egyéb gyümölcsök) a tápanyag utánpótlására vagy hiánybetegségeik megelőzésére, gyógyítására használható.

Repce: 10-15 l/ha; 100-250 l/ha vízmennyiség; 4-6 leveles állapot

Repce: 15-20 l/ha; 100-250 l/ha vízmennyiség; Szárba indulás és virágzás között

Kalászosok: 15-20 l/ha; 100-250 l/ha vízmennyiség; Bokrosodás kezdetétől a kalász megjelenéséig

Napraforgó: 15-20 l/ha; 100-250 l/ha vízmennyiség; 4 leveles állapottól csillag-bimbós állapotig

Kukorica: 15-20 l/ha; 100-250 l/ha vízmennyiség; leveles állapot és 15-20 nap múlva

Cukorrépa: 15-20 l/ha; 100-250 l/ha vízmennyiség; leveles állapot és 1 hó-nap múlva

Gyümölcsösök: 5-10 l/ha; 300-750 l/ha vízmennyiség; 1-1 alkalom: virágzás előtt, virágzás után és a szüretet követően, levélhullás előtt

Továbbá a kezeléseket a tápanyaghiány mértékének megfelelően 2-6 alkalommal meg lehet ismételni.

Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, ételtől, italtól, takarmánytól elkülönítve, száraz, fedett, hűvös - de fagymentes - helyen korlátlan ideig eltartható.

Egyéb előírások:

A lombtrágyázás esetén is be kell tartani a permetezés alapvető szabályait. Tilos keverni ásványi olajokkal, lúgos vagy szulfát tartalmú termékekkel.

Növényvédő szerekkel általában együtt is alkalmazható, de a keverhetőséget előzőleg javasoljuk

megvizsgálni.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését.

A szembe vagy bőrfelületre került szert bő vízzel le kell mosni!

Tilos a készítményt és csomagolóanyagát folyókba, tavakba, vagy víztározókba juttatni.



P R I M A G

— 1991 —