

BactoFil Cell

Státusz: rendelhető

Termék neve: BactoFil Cell

Dózis: 1 l/ha

Felhasználás: tarlóbontás

Ajánlás: biogazdálkodás

BactoFil CELL- a cellulózbontó

Ökológia gazdálkodásban is felhasználható készítmény!

Ha egy egészséges termőtalajba beszántják a kukorica vagy a napraforgó betakarítása után a táblán lévő növénymaradványokat, akkor az természetes módon 2-4 év alatt gyakorlatilag teljesen elbomlik.

Jelenleg az a helyzet, hogy az elmúlt évtizedekben történt intenzív kemizálás következtében a talajokban élő hasznos baktériumok száma közel a tizedére csökkent.

Ezzel a folyamattal párhuzamosan egyre nagyobb termőképességű kukorica és napraforgó fajták és hibridek kerültek termesztésbe, amelyek a nagyobb termés mellett többnyire jóval nagyobb zöldtömeget is fejlesztenek.

A csökkent baktériumszám a megnövekedett zöldtömeg lebomlását csak jóval lassabban tudja elvégezni, ezért sok esetben a növénymaradványok évek múlva is jelen vannak a talajban és számos problémát okoznak.

A fenti problémára kiváló megoldást nyújthat egy innovatív mikrobiológiai termékújdonosság, a **BactoFil CELL, amely mindössze egy liter/hektár adagban kijuttatva a jelenleg ismert legerősebb cellulóz- és lignocellulózbontó képességével, hónapok alatt lebontja a kukorica és anapraforgó szár-, levél- és gyökérmaradványait.**

Ezáltal a növénymaradványok márnem gondot és problémát jelentenek, hanem a bennük található minden érték akövetkező növénykultúra fejlődését szolgálja.

A BactoFil CELL dióhéjban:

- A BactoFil CELL hatására **javul a talaj művelhetősége, a szerkezete, a vízháztartása és nő a humusztartalma.**
- A kártevők és a kórokozók átteleléséhez szükséges élettér jelentősen csökken.
- Elsősorban a napraforgó esetében különösen nagy jelentősége van a hasznos talajbaktériumok fertőtlenítő hatásának, amely lényegesen csökkenti a legsúlyosabb betegségek fertőzésveszélyét.
- A szerves tápanyagok feltárása, deponálása és a humifikálás miatt a műtrágyázás elhagyható vagy a mennyisége lényegesen csökkenthető.
- A BactoFil CELL készítményben található baktériumok által termelt jelentős celluláz és xilanáz enzimaktivitás miatt a hosszú C-láncú cellulóz és lignocellulóz molekulák szerkezete megbomlik és szőlőcukor képződik, amely a termékben lévő N-fixáló baktériumok működéséhez szükséges, mint szénforrás.
- Emellett a kukorica- és napraforgó növénymaradványaiban található makro- és mikroelemeket is humifikálja a termék. Az elbontott növénymaradványok már nem okozzák

az előzőekben bemutatott problémákat, hanem javítják a talaj szerkezetét és vízháztartását.

- A legnagyobb nitrogénkötő hatás akkor érhető el, ha tarlóra permetezett hektáronként 1 liter BactoFil CELL-t kiegészítjük tavasszal 1 liter/ha - a növényfajnak megfelelő BactoFil A 10 vagy BactoFil B 10 készítménnyel, hiszen így nagyszámú N-kötő baktériummal tudjuk beoltani a talajt.

Mit tartalmaz a BactoFil CELL:

Azotobacter vinelandii, Pseudomonas fluorescens, Cellvibrio ostrviensis mikroorganizmus variánsok, makro- és mikroelemek, mikroorganizmusok által bioszintetizált hatóanyagok (növekedésserkentők, növényi hormonok, vitaminok).

Károkat okozhat a nagy termés?

A jelenlegi terméskilátások alapján mind napraforgóban, mind kukoricában jelentősen több szár- és gyökérmaradványra számíthatunk, mint az elmúlt években. A nagy mennyiségű szár- és gyökérmaradvány - azok elbontása nélkül - komoly problémákat jelentenek a talajművelés és a következő kultúrnövény (kalászos) tekintetében.

Melyek ezek a problémák?

- káros pentozán hatás
- segíti a kórokozó gombák (pl. fuzárium) és a kártevők (pl. kukoricamol) áttelelését
- károsan hat az utóveteményre
- talajszerkezet romlás
- rosszabb vízgazdálkodás
- nehezebb talajművelhetőség

A nitrogénnek a szárbontáshoz közvetlenül semmi köze nincs. A nitrogénre főként a káros pentozán hatás ellen van szükség, de BactoFil CELL használatakor el is hagyható. **Ugyanakkor a tarlón maradt szár- és gyökérmaradványok hatalmas tápanyagforrást jelentenek**, melyet csak baktériumok használatával tudunk a következő növény számára felvehetővé tenni.

A BactoFil CELL használatának előnyei:

- a tarlómaradványok gyors és hatékony elbontása
- tápanyagfeltárás (talajból és a növényi maradványokból)
- nitrátérzékeny területen korlátozás nélkül használható
- nitrogénkötés
- a káros pentozán hatás elkerülése
- "talajfertőtlenítés"
- javítja a talaj vízgazdálkodását
- humifikál (szerves trágyát pótol)
- jobb talajszerkezetet biztosít

Hogyan kell használni a BactoFil CELL-t?

A BactoFil CELL kijuttatása az aratást követő szárazulás után időszerű. A kijuttatást követően a szármaradványokkal együtt forgassuk alá 2-4 órán belül. Amennyiben nincs UV sugárzás (borult idő), ez esetben a bedolgozást később is elvégezhetjük. Nem keverhető folyékony műtrágyákkal vagy UAN oldatokkal.

Dózisa: 1,0 l/ha, melyet szántóföldi permetezőgéppel 200-400 l/ha vízmennyiséggel kell kipermetezni. Az erőgépre vagy a talajművelő eszközre szerelt BactoFil JET készülékkel 40?60 l/ha vízmennyiséggel a talajműveléssel egy menetben is kijuttatható. A BactoFil CELL hatékonysága nedvesítőszer (Trend, Silvet) hozzáadásával fokozható.

Mikor NE használjunk baktériumtrágyát?

Amennyiben a kijuttatás idején aszály van és a talaj a bedolgozás mélységéig száraz, várjuk meg a kijuttatással a csapadékos periódust!



P R I M A G

— 1991 —