GeoAgit-CNPK-1

Ajánlás: tarlóbontás

AÖP: AÖP

BIO: BIO

Dózis: 5-10 l/ha

Státusz: Rendelhető

Típus : talajszerkezet-javító

A GeoAgit CNPK-1 hasznos talajbaktériumok összeválogatásából fejlesztett baktériumkészítmény

Előnyös hatásai

- Légköri Nitrogén megkötése (Azotobacter vinelandii, Azospirillum brasilense).
- Foszfor- és Káliummobilizálás (Pseudomonas fluorescens, Bacillus circulans).
- A talaj szerves anyagainak bontásával jelentősen hozzájárulnak a tarlómaradványok gyorsabb humifikálásához (így javul a művelhetőség), könnyen hasznosítható összetett cukrokat szabadítanak fel a cellulózból, amelyek a növényi növekedést elősegítő rhizobaktériumok elszaporodásához optimális szénforrást jelentenek (Cellvibrio sp., Pseudomonas fluorescens, Streptomyces cellulose).
- Hormontermelés, fokozza a növény anyagcseréjét, növekedését (Azospirillum brasilense, Azotobacter vinelandii).
- Sziderofor termelés, a vas megkötésével gátolják a növényi kórokozó mikroorganizmusok elszaporodását (Pseudomonas fluorescens).
- Az egészséges talajéletet szabályozó anyagcseretermékeikkel javítják a növények ellenállóképességét a növénypatogén gombákkal szemben (Streptomyces cellulosae, Pseudomonas fluorescens).
- A készítményben a kedvező hatású talajbaktériumok össz.csíraszáma: min. 1,5*109 db/cm3.
- A GeoAgit CNPK-1 baktériumok a tenyésztés és a gyártás során alkalmazott technológia révén a talaj kedvezőtlenebb körülményeit, az időjárási stressz-hatásokat is jól tűrik.

Dózis

- Szántóföldön 5 l/ha, kertészetben 10 l/ha, melyet két menetben történő kijuttatáshoz 20-40-szeres vízmennyiséggel
- Mikro-Spray adapterrel történő egymenetes kezeléshez 10-szeresen célszerű hígítani
- Csepegtető öntözéssel is kijuttatható

Használható

- termésnövelésre szántóföldi- és kertészeti kultúrákban egyaránt, a tavaszi és őszi talaj-,

illetve magágy előkészítés vagy vetés, ültetés során,
- ültetvénytelepítéskor a begyökeresedés elősegítésére szőlő- gyümölcs- és zöldség kultúrákban,
- palántaneveléskor erős, elágazóbb gyökér neveléséhez,
- műtrágyadózis egy részének megtakarításához és természetes tápanyagokkal történő kiegészítéshez bármely kultúrában,
- talaj termőerejének, növények vigorának, stressztűrő képességének javítására,
- rendszeresen, intenzíven művelt és/vagy egyoldalúan trágyázott területek biológiai aktivitásának fenntartására.

Eltartható

- 0-10 fokon: 3 hónap
- 10-20 fokon: 1 hét

PRIMAG
1991