

Hechta Szárbontó

Ajánlás: talajoltás

AÖP: AÖP

BIO: BIO

Dózis: 0,25-0,5 l/ha

Státusz: Rendelhető

Típus : talajszerkezet-javító

A termék olyan baktériumtörzseket tartalmaz, melyek élnek ugyan a hazai talajokban, de általában kis számban. Gyors és intenzív cellulózbontást érhetünk el a termék alkalmazásával. A benne szereplő baktériumok már alacsony talajhőmérsékleten is szaporodnak. Mivel a talajkémhatás szempontjából tágtűrésű baktériumtörzsek alkotják, ezért savanyú, lúgos és normál talajokon is eredményesen alkalmazható a szárbontó készítmény. A intenzív szárbontás során nem csak fevehető tápanyagot biztosítunk a következő termesztett növény számára, de növeljük a talaj humusztartalmát és a talajélet minőségét is. A készítmény a talajban felszaporodó káros patogén gombákat eredményesen visszaszorítja, mivel ezek a gombák a szármaradványokon telelnek át és ha ezek a szármaradványok gyorsabban lebomlanak a káros gombák mennyisége a talajban csökken.

Felhasználás

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a tarló és a szármaradványok kezelésére, szárbontásra, 0,25-0,5 l/ha mennyiségben a kijuttató eszköztől függően 50-400 l/ha vízmennyiséggel a szármaradványokkal borított talajra permetezve, majd a talajba beforgatva.

Szőlő és gyümölcs kultúrában a metszési nyesedékre permetezve, majd bedolgozva használható.

A termék nem keverhető baktérium és gombaölő növényvédő szerekkel. Használat előtt a palackot, kannát jól fel kell rázni!

Összetevők:	Eng. szám
Paenibacillus sp. baktérium törzsek	8360/53318-2/2025
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Veszélyesség vízi szervezetekre:	nem jelölésköteles
AÖP:	2 pont
Eltarthatóság:	18 hónap

Kultúra	Felhasználás	Dózis (%)	Kijuttatás száma
Valamennyi	A szármaradványokkal	0,25-0,5 l/ha	Évente 1-4

szántóföldi és kertészeti kultúra	borított talajra, szőlő és gyümölcs kultúrában a metszési nyesedékre permetezve, majd bedolgozva		alkalommal
Komposztálás	A komposztálendő anyagra kipermetézve és bekeverve	5 ml/m ³	



P R I M A G

— 1 9 9 1 —