

Tigra

Ajánlás: talajoltás

AÖP: AÖP

BIO: BIO

Dózis: 5-10 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Típus : biokontroll hatású

A Tigra® a Trichoderma asperellum gombafaj magas spórakoncentrációját tartalmazó szilárd készítmény, különleges formulációban. A kristálycukorra felvitt Trichoderma telepek közvetlenül és gyorsan kapják meg azt a kezdeti szénhidrát tápanyag mennyiséget, amely a gombafaj talajban történő gyors felszaporodásához vezet. Ez a gombafaj különböző típusú gombaellenes vegyületeket termel melyek gátolják, vagy elpusztítják a növénykórokozó gombákat. Trichoderma gombafaj képes más gombák fonalait felismerni, azokra rátekeredni, a megtámadott gomba sejtfalát feloldani, majd a célgomba fonalainak belsejébe hatolva annak beltartalmát tápanyagként hasznosítani. A Trichoderma kiválóan használható a szklerotínia, makrofómina, alternária, toftóra fajok talajból történő fertőzésének csökkentésére többek között napraforgó, repce és szója kultúrákban.

Felhasználás

A Tigra®-t 5 kg/ha-os dózisát a talaj felszínére kell kijuttatni. A permetezéshez 200-400 liter vizet használunk. A Tigra® készítményt ki lehet permetezni vetés, ültetés előtt és után, ill. később a tenyészidőszak során. Sekély (5-10 cm mély) bedolgozás, eső, vagy öntözés segíti a Trichoderma spórák bejutását az aktív gyökérrendszerhez. A Tigra® vetéssel egy menetben folyékony kijuttató berendezéssel közvetlenül a magárokba, valamint kertészeti rendszerekben öntözővízzel is kijuttatható.

Gombaölő szereken kívül mindennel keverhető, a permetezési szórás-kép nem meghatározó, granulátum és folyékony műtrágyákkal együtt is kijuttatható. A permetezés időzítése nem elsődleges szempont, mivel nincs sürgős bedolgozási, ill. bemosódási kényszer, néhány hétig a gombaspórák túlélnek a talajon vagy a növények felületén. Egy növénynél a többszöri kijuttatás javítja a hatékonyságot.

Összetevők	Eng. szám
Trichoderma asperellum gomba T1 törzse	04.2/2612-1/2016
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
Veszélyesség vízi szervezetekre:	nem jelölésköteles
AÖP:	2 pont
Eltarthatóság:	12-18 hónap

Kultúra	Felhasználás	Dózis (%)	Kijuttatás száma
Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában.	Talajelőkészítéskor, vagy legkésőbb vetéskor a talajra permetezve és bedolgozva vagy mikrogranulátum szóróval a vetéssel egy menetben kijuttatva	5kg/ha 10-20 kg/ha	Nincs korlátozás

PRIMAG
— 1991 —