

## Lidacta csávázatlan

**Ajánlás:** takarmányozás

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Norma:** 40-60 kg/ha

**Státusz:** Rendelhető

(Dactylis glomerata)

### Főbb jellemzők:

- A csomós ebír tavasszal korán kihajtó, bőven termő, laza bokrú szálfű.
- Élettartalma 4-6 év. Kitűnő árnyéktűrő képességű.
- A szárazságot jól tűri. Aszályos területen is hosszú ideig megmarad a telepítés után.
- Agresszív növény, katlanozik, tenyerel, s elnyomókészsége nagy.
- A gyepeben zombékákat képez ezáltal. Ezt telepítéskor figyelembe kell venni.
- Fiatal korában az állatok szívesen legelik (szarvasmarha, juh), de gyorsan fásodik, fűtermése durva lesz, íze romlik, amikor az állatok már nem szívesen fogyasztják.
- A nádképző csenkesz mellett a csomós ebír élettartama a leghosszabb, még nehéz körülmények között is képes 4-8 éven keresztül teremni.
- Takarmányozási értéke az angolperje után a legjobb.

Erózió elleni védelemre sűrűn vetett jól záródó gyepe kiválóan alkalmas. Az így telepített állománynak a minősége is jobb lesz (Barcsák - Kertész 1986).

### További tulajdonságok:

- mag: végén sarlószerűen görbült
- elhegyesedő rövid szálkában végződik
- pelyvátlan
- háromélű
- rövid maggyevecske korongszerűen kiszélesedik
- lazabokrú szálfű hosszú életű
- virágzata valódi buga (egy- vagy több elágazás, majd többszörös)
- fehér csúcsban végződő nyelvecske
- fülecske nincs
- agresszív, térdes fejlődésű (katlanozik)
- árnyéktűrő