

Kunsági2 csávázott II. fok

Ajánlás: takarmány

Csávázás: csávázott

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: II. fok

Vetésidő: őszi

Növekedési típusa félig felálló, a bokrosodó képessége kiváló. Zászlóslevele közepesen visszahajló, levélhüvelye viaszossága nagyon erős, szármagassága közepes. Kalászolási időpontja igen korai, a kalász viaszossága gyenge-közepes, állása vízszintes, többsoros alakja párhuzamos, lazán-közepesen tömött.

A kalász rövid, a szálkák hosszúak, antociánosságuk hiányzik. A szem aleuron rétegének színe fehér. Állóképessége jó.

Termőképessége jó-kiváló, optimális termesztési körülmények között és optimális időjárás esetén termése 6,5 tonna hektáronként. Hektoliter tömege 62-65 kg, ezerszemtömege közepes 41-43 g. Nyersfehérje tartalma 12,0-13,0 %.

Fagy- és télállósága nagyon jó-kiváló, szárazságtűrő képessége nagyon jó. Műtrágya reakciója nagyon jó. Rinhospóriumos levélfoltossággal szemben rezisztens, helmintospóriumos levélfoltosságra átlagosan ellenálló, törperozsdára és liztharmatra közepesen fogékony

Vethető minden jó és közepes termőerőben lévő középkötött vályogtalajon, réti talajon, erdőmaradványos csernozjom talajon.

Optimális vetésidője: Október 10. és 25. között. Az északi megyékben ennél egy héttel korábban, a déli megyékben egy héttel később is vethető. Későbbi vetéssel a sárga törpeség vírusos (BYDV) fertőzés jó eséllyel elkerülhető.

Javasolt vetőmagdózis: 4,0-5,0 millió csíra/ha.