

## KWS Sirtaki csávázott II. fok

**Ajánlás:** malmi


**Csávázás:** csávázott

**Státusz:** Előrendelhető

**Szap. fok:** II. fok

**Típus :** tar

**Vetésidő:** őszi



Nagy termőképesség és akár malmi minőség!!

A **SIRTAKI** közép-korai típusú, tar kalású, intenzív termesztés technológia mellett kiemelkedően magas termőképességű őszi búza fajta.

### Jellemzők:

- kiemelkedően magas terméspotenciál és jellemzően euró minőségű szemtermés
- közép-korai szárból indulás, kaláshányás és érés
- szalmája alacsony (átlagosan 50-60 cm magas)
- megdőlésre nem hajlamos
- jó bokrosodó képesség
- kiváló télállóság
- jó stressztűrő képesség jellemzi
- laza homokos talajokon is magas szemtermésre képes
- levélzete, szára grafitszürkés színű, erősen viaszos
- kórtani tulajdonságai kedvezőek, egészséges levélzetét a teljes érés végéig megőrzi
- kiemelkedő sárgarozsda elleni toleranciával rendelkezik
- fuzáriumra, lisztharmatra nem érzékeny
- szeptóriás levélfoltosságra közepesen érzékeny
- megbízható, biztonságosan nagy hozammal termelhető fajta

### Beltartalmi paraméterek:

- B2 farinográf érték
- közepes fehérje (11-13%)
- közepes sikértartalom (22-28%)
- közepes-magas hektoliter súly (76-80 kg/hl)
- magas esésszám (320-370 sec)

- közepes- magas W-érték (átlag 190)
- alacsony P/L-érték (átlag 0,5)

Agronómiai jellemzők: kiemelkedően magas termékpotenciál mellett kiváló szárszilárdság. Szalmája alacsony, megdőlésre nem hajlamos, jó a stressz tűró képessége.

Optimális vetési idő: szeptember - végén november közepéig.

Betegség ellenálló képesség: Toleráns a klórtoluron hatóanyagú gyomirtó szerekre. Magas rozsda elleni rezisztencia. Fuzáriumra, lisztharmatra, szeptóriás levélfoltosságra közepesen érzékeny. Fungicides védekezés megelőző jelleggel ajánlott.



P R I M A G

— 1991 —