Big Texan BMR csávázatlan

Ajánlás: BMR/bióban is

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Nemesítő: nem specifikálható

Státusz: Előrendelhető

Típus : bugás

- Kiemelkedően szárazságtűrő, kiváló a vízgazdálkodása, a kukoricánál lényegesen (30-50%-kal) kevesebb vízzel is beéri
- Korai másodvetésű kultúraként is termeszthető
- Tápanyagigénye alacsonyabb a kukoricáénál
- Egyszerűen tárolható és könnyen silózható (a magas cukortartalom miatt könnyen erjed)
- Viaszérésben betakarítva kb. 35 % szárazanyag-tartalmú, jó beltartalmú szilázstakarmányt ad
- A kukoricabogárnak ugyan gazdanövénye, de a bogár fejlődési láncolata megszakad, azaz nem szaporítja az egyedszámot, így alkalmas a kukorica monokultúra által okozott probléma orvoslására
- Tenyészidőszak: középkorai – 90-100 nap keléstől a betakarításig, a viaszérés elejéig.
- Közepes magasságú növény
- BMR hibrid lévén lignintartalma alacsony
- Csávázatlan formája ökológiai gazdálkodásban is használható

Termesztéstechnológia

- Vetési ideje: a kukorica vetése után, május elejétől – júliusig. Vetésmélységben 15 fokot igényel a csírázáshoz.
- Vetési dózis: 8-11 kg/ha , 22 szem/m2 (precíziós vetőgéppel)
- Vetési módja: gabonavetőgéppel, 3-4 cm mélyre, 70-75 cm sortávra, a betakarítógép függvényében.
- Tápanyagellátás: a termőhelyre jellemző kukorica tápanyag kb. 20-30 %-kal csökkenthető.
- Betakarítás: a cirok magja viaszérés elején legyen, ilyenkor a szilázs kb. 35 % szárazanyag-tartalmú lesz.
- Tenyészideje 90-100 nap.