

Szegedi 1023 Antidóttummal csávázott

Ajánlás: seprűcirok

Csávázás: csávázott

Kezelés: Antidóttummal

Nemesítő: SPR

Státusz: Rendelhető

Típus : bugás

Információk a vetéshez

- A cirok rossz kezdeti fejlődésű növényfaj, ezért a vetés ideje a vetőágy milyensége az egyik legfontosabb feltétel a termesztésben.
- A cirok rög-, gyomnélküli, aprómorzsa, sima felszínű tömött vetőágyat igényel.
- Az ajánlott sortávolság 10-12 cm.
- Az optimális tőszám 140-170 ezer tő/ha.
- Vetőmagigény 3-5 kg/ha a fajtától függően.
- A tenyészterület nagysága döntően befolyásolja a szakáltermés mennyiségét, minőségét és az állomány kiegyenlítetttségét.
- A termesztők körében kedvelt közép-késői érésű fajta, tenyészideje 125-135 nap. Állománymagassága 115-120 cm, a legkevesbé fattyasodik, kiegyenlítetttsége kiváló. Hosszú szakállú 65-70 cm fajta, nagyon jó ipari minőséget a többi fajtánál sűrűbb állományban adja, ezért termesztését nagyobb tőszámon javasoljuk. Szakáll-termőképessége a fajták között a legnagyobb 3,2-3,5 t/ha.