

## **Szegedi Szlovák Antidótummal csávázott**

**Ajánlás:** seprűcirok

**Csávázás:** csávázott

**Kezelés:** Antidótummal

**Nemesítő:** SPR

**Státusz:** Előrendelhető

**Típus :** bugás

A termesztés sikere, a megtermelt cirokszakáll minősége nemcsak a választott fajtától és a jó minőségű vetőmagtól függ, hanem (mint arra az elmúlt évek szélsőséges időjárása rámutatott) a technológia pontos betartásától is. A seprűcirok esetében különösen a megfelelő vetésidőre és tőszámra kell ügyelni.

- Korai és nagyon jó ipari tulajdonságú fajta.
- Magvas termésének szakállaránya igen jó.
- A cirok rossz kezdeti fejlődésű növényfaj, ezért a vetés ideje és a vetőágy milyensége az egyik legfontosabb feltétel a termesztésben.
- A cirok rög-, gyomnélküli, aprómorzsás, sima felszínű tömött vetőágyat igényel.
- Az ajánlott sortávolság 10-12 cm.
- Az optimális tőszám 140-170 ezer tő/ha.
- Vetőmagigény 3-5 kg/ha a fajtától függően.
- A tenyészterület nagysága döntően befolyásolja a szakáltermés mennyiségét, minőségét és az állomány kiegyenlítetttségét.
- Termőképesség: Jellemzően magas, különösen a sűrűbb állományban.
- Szárazságtűrés: Nagyon jól tolerálja a szárazságot, melegigényes növény.
- Termőhely: Homoktalajon finomabb, kötött talajon durvább szakállt nevel.