

IS Belladur csávázott I. fok

Ajánlás: prémium

Csávázás: csávázott

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: I. fok

Típus : szálkás

Vetésidő: őszi

Licensz szerződés megkötése mellett vásárolható vetőmag!

Az IS Belladur középkorai érésű, kiváló tésztaipari minőségű őszi durumbúza fajta, amely az (S-13 x IS Pentadur) x Riveldur keresztezésből lett kinemesítve. Télállósága kiváló, bokrosodóképessége magas, szalmája közép magas, megdőléssel szemben közepesen ellenálló. A régebbi minősített fajtákhoz képest magasabb fokú lisztharmat és levélrozsdá rezisztenciával rendelkezik, értékes tulajdonsága a megbízható vírustolerancia. Az IS Belladur kiváló termőképességgel rendelkezik, intenzív kisparcellás kísérletekben 11 t/ha feletti szemtermés elérésére is képes.

A fajta előnyei

- Kiváló fagy- és télállóság
- Átlag feletti betegség-ellenállóság
- Magas és stabil terméshozamok
- Kiváló tésztaipari minőség

Termesztési javaslatok

Az IS Belladur a legmagasabb terméshozamokat és a legjobb minőséget a jó tápanyag- és vízgazdálkodású talajokon éri el. Vetését szemeskukorica után, a fuzáriumos kalászfertőzés elkerülése végett nem ajánljuk. A fajta átlagon felüli betegség-ellenállósággal rendelkezik, termesztésekor a lisztharmat és levélfoltosság elleni védekezésre kell nagyobb figyelmet fordítani. Intenzív termesztéstechnológia esetén közepes dózisú növekedésszabályozó használata ajánlott. Az esetleges kalászfuzáriumos megbetegedéseket a virágzás kezdetekor kijuttatott azol hatóanyagú gombaölő szerek alkalmazásával kerülhetjük el. Optimális vetésidő: október 1 - 15., ajánlott csíraszám jó kelési feltételek mellett: 4,5 - 5,0 millió csíra/ha.

Növekedés és fejlődés

- Bokrosodóképesség	magas
- Tavaszi fejlődés	közepes
- Magasság	962-9 cm
- Éréscsoport	középkorai

Télállóság	kiváló (+++)
Állóképesség	közepes (+)

Termőképesség*

- közepes intenzitás	7,5-9,4 t/ha
- magas intenzitás	8,8-11,2 t/ha

Terméskomponensek

- Állománysűrűség	közepes
- Szemszám/ kalász	közepes
- Ezermagtömeg	42-44 g



P R I M A G

1991

Tésztaipari minőség

- Üvegesség	kiváló (+++)
- Üvegesség stabilitása	magas (++)
- Hektolitertömeg	780-810 g/l (+++)
- Fehérjetartalom	14,0-15,3 % (+++)
- Nedvessikér-tartalom	30-34 % (+++)
- Karotinoid-tartalom a darában	9,5-11,0 ppm (+++)
- Esésszám	290-360 sec. (++)
- Esésszám stabilitása	közepesen magas (++)

Betegségrezisztencia

- Lisztharmat	7,2 (++)
---------------	----------

- Levélfoltosság	6,1 (+)
- Levélrozsa	7,0 (++)
- Sárgarozsa	8,1 (+++)
- Szárrozsa	7,9 (+++)
- Kalászfehéredés	7,2 (++)
- Kalászfuzárium	6,9 (++)
- Vírusbetegségek (BYDV, WDV)	7,8 (+++)

Optimális vetésidő
Kései vetés
Gabona utáni vetés
10.1.-10.15.
kevésbé alkalmas (0/-)
nem ajánlott

Ajánlott csíraszám

- Korai vetés, jó kelési feltételek	4,3-4,5 millió csíra/ha
- Optimális feltételek	4,5-5,0 millió csíra/ha
- Kései vetés, gyengébb kelési feltételek	5,0-5,5 millió csíra/ha

Nitrogén trágyázás

- Regenerációs (BBCH 21-28)	40-50 kg N/ha
- 1. mennyiségi (BBCH 29-31)	30-40 kg N/ha
- 2. mennyiségi (BBCH 32-37)	30-40 kg N/ha
- Minőségi (BBCH 49-51)	20-30 kg N/ha

Növekedés-szabályozók

- közepes intenzitás	Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29)
- Magas intenzitás	Stabilan 0,8-1,0 l/ha (BBCH 25-29), Moddus 0,3l/ha (BBCH 31)

Növényvédelem

- Infekciós nyomás szerint	inszekticid vírusvektorok ellen (BBCH 13-21)
----------------------------	--

- Infekciós nyomás szerint

szélesspektrumú fungicid
lisztharmat és levélfoltosság
ellen (BBCH 30-49)

- Preventív védelem

azol hatóanyagú fungicid
kalászfuzáriózis ellen (BBCH
51-65)



P R I M A G

— 1991 —