

## Maxi csávázatlan II. fok

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Magszín:** fehér

**Státusz:** Rendelhető

**Szap. fok:** II. fok

**Típus :** étkezési



?

- Szára 80-110 cm magas.
- Levele világoszöld színű, 20-35 cm hosszú, felálló.
- A buga közepesen tömött, 15-25 cm hosszú, színe virágzaskor zöld, betakarításkor sárga.
- A szemtermése közel gömb alakú, színe fehér világossárga árnyalattal.
- Ezerszemtömege: 7-7,5 gramm.
- Szemtermése jól hántolható.
- Tenyészideje: 118-123 nap.
- Melegigényes, szárazságtűrő képessége kiváló.
- Termesztésének különösen az extenzív területek hasznosításában van jelentősége.
- Termőképessége kiváló, 3,0-4,0 t/ha szemtermés is elérhető.
- Szemtermése emberi fogyasztásra és madáreleségként is felhasználható.

### Norma

Gabona- vagy duplagabona sortávra, folyóméterenként 50-60 db csírával, (35-50 kg vetőmag/ha), 2-3 cm mélyre kell vetni.

### Agrotechnika

A magágy minőségére kevésbé érzékeny, a rosszul előkészített rögös talajból is kikelhet, az egyöntetű, gyors keléshez aprómorzsás, tömörített magágyat igényel. Vetésideje április vége - május eleje.

A besűrítésre termés csökkenéssel reagál.

Kétszikű gyomok ellen a gabonában használt gyomirtó szerek alkalmazhatóak, egyszikűirtó szere nincs, viszont megfelelő állománysűrűség mellett a kiváló gyomelnyomó képessége miatt ez nem is szükséges.

Tenyészideje közel van a kakaslábfű tenyészidejéhez, ezért kakaslábfű fertőzött területre ne vessük. Szempergésre csak kissé hajlamos, de a túlérést a madárkár miatt meg kell előzni.



P R I M A G  
— 1991 —