DKC 5810 Acceleron HD csávázott+stimulátor

Ajánlás: szemes

Csávázás: csávázott+stimulátor

Kezelés: Acceleron HD

Nemesítő: Dekalb

Státusz: Előrendelhető

Tenyészidő: FAO500-599

DKC 5810 – Kiemelkedő alkalmazkodóképességű, stabil, nagy terméspotenciálú hibrid

A DKC 5810 a középérésű kukoricahibridek felső szegmensébe tartozik, amelyet a termelők elsősorban megbízható termőképessége, jó stressztűrése és kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságai miatt részesítenek előnyben. A hibrid FAO 490–510 éréscsoportba sorolható, a klasszikus 500-as érésidő stabil képviselője. Kifejezetten jól reagál a termőhelyi adottságokra, és szélsőséges évjáratokban is képes megtartani termésbiztonságát.

Agronómiai jellemzők

A DKC 5810 erőteljes korai fejlődéssel rendelkezik, így gyors kelést és dinamikus kezdeti állományfejlődést biztosít. Növekedési erélye közepes–erős, növénymagassága az évjárati hatásoktól függően közepesen magas. A csövek 16–18 sorosak, jó szemkitelítő képességgel, ami hozzájárul a hibrid stabil, magas termésszintjéhez. A szemek fogazott, „dent” típusúak, aranysárga színnel és kedvező ezermagtömeggel, ami előnyös a szárítási és feldolgozási folyamatban is.

A hibrid kiváló csőegészségű, az üszöggel és a fuzárium fajokkal szemben átlag feletti toleranciát mutat. Betegségekkel szemben összességében jó ellenálló képességgel rendelkezik, ami alkalmassá teszi intenzív termesztésre és gyengébb adottságú területekre egyaránt. Szárszilárdsága megbízható, dőlésre kevéssé hajlamos, ami megkönnyíti a gépi betakarítást és mérsékeli a veszteséget.

Termőképesség és érésdinamika

A DKC 5810 egyik legnagyobb előnye a kiemelkedően stabil hozam, amelyet a különböző termőhelyi körülmények között is képes megismételni. A hibrid erős kompenzációs képességgel bír: kedvező környezetben magas terméspotenciált, szárazabb évjáratokban pedig megbízható, kiegyensúlyozott termést biztosít. A vízleadása érés végén gyors és egyenletes, ami csökkenti a betakarításkori nedvességet és javítja a gazdaságosságot.

Termesztéstechnológiai ajánlás

A hibrid az intenzív tápanyag-visszapótlást különösen jól meghálálja. Optimális tőszámja jó vízellátottság mellett 70–75 ezer tő/ha, átlagos vagy szárazabb körülmények között 60–67 ezer tő/ha ajánlott. A vetésidő tekintetében rugalmas, április közepétől május elejéig biztonsággal vethető. Különösen ajánlott olyan gazdaságok számára, amelyek a stabil terméseredményt és a kiszámítható agronómiai teljesítményt részesítik előnyben.

PRIMAG
1991