

## Hanga LM csávázott

**Ajánlás:** szemes

**Csávázás:** csávázott

**Nemesítő:** Zeamag

**Státusz:** Rendelhető

**Tenyészdő:** FAO200-299

A hibrid valamennyi fejlődési fázisát (vegetatív és generatív) az intenzitás jellemzi → erőteljes kezdeti fejlődés, igen korai virágzás, gyors szárazanyag beépülés, éréskori dinamikus vízleadási ütem. Alacsony hőösszeg igénye miatt a hűvösebb klimatikus viszonyok melletti termesztésre is alkalmas. Minden hibrid termésmennyisége alapvetően az összevirágzás sikerességétől függ. A Hanga LM ebből a tekintetből abszolút kockázatmentesnek tekinthető → nővirágzása a legelső között, még júniusban, a klasszikus júliusi kánikula előtt zajlik le. Átmeneti, flint/dent jellegű szemekkel berakott csövei végig termékenyülnek a csövet takaró csuhé védelmében; ugyanakkor az éréskor fellazuló csuhé rásegít a gyors vízleadásra. Alacsony FAO számához versenyképes hozamszint társul, az éréscsoport standardhoz képest jelentős hozamnövekedéssel számolhatunk.

PRIMAG  
— 1991 —