Inaltera csávázott

Ajánlás: szemes

Csávázás: csávázott

Nemesítő: Saaten Union

Státusz: Rendelhető

Tenyészidő: FAO300-399

INALTERA csávázott

Az a SAATEN-UNION középkorai éréscsoportba tartozó, szemes hasznosítású hibridje. Olyan gazdaságok számára lehet jó választás, ahol a magas terméspotenciál mellett fontos a termőhelyi alkalmazkodóképesség, a korai virágzás és a változó időjárási körülményekhez való igazodás. A csávázott vetőmag használatra kész vetőmagot kínál, amelynél a csávázószer pontos összetételét és a kezelés részleteit az aktuális vetőmagtétel címkéjén találod.

Középkorai kukoricahibrid sokoldalú termesztésre

Az INALTERA a SAATEN-UNION újabb kukoricahibridjei közé tartozik, FAO 390-es éréscsoporttal. A gyártói ismertetés szerint korai virágzású, jó hő- és aszálytűrésű hibrid, amelynek erőteljes gyökérzete és harmonikus vízleadása egyaránt hozzájárul a termesztési értékéhez.

A korai virágzás különösen fontos tulajdonság lehet a nyári hő- és vízstressznek kitett termőhelyeken. A virágzás és a termékenyülés időszakában jelentkező kedvezőtlen körülmények ugyanis jelentősen befolyásolhatják a csőképződést és a végső terméseredményt. Az INALTERA tulajdonságai ezért a változékony időjárású évjáratokban is érdekes alternatívává teszik.

Terméspotenciál és kísérleti eredmények

Az INALTERA teljesítményét a 2026-os hazai kisparcellás kísérletekben is vizsgálták. Bólyban, öntözetlen körülmények között 7,67 t/ha termést ért el, ami a kísérleti átlag 107%-ának felelt meg. Nagyhalászon, öntözött kísérletben 14,82 t/ha terméssel a kísérleti átlag 113%-át teljesítette.

A Debreceni Egyetem Látóképi kísérleti telepén, intenzív, öntözött körülmények között a hibrid 15,4 t/ha terméseredményt ért el a 2026-os, rendkívül meleg évben. Ezek az adatok jól szemléltetik a hibridben rejlő terméspotenciált, ugyanakkor kísérleti eredmények: nem tekinthetők minden termőhelyre és termesztéstechnológiára érvényes hozamígéretnek.

Miért válaszd?

- FAO 390 éréscsoport: középkorai hibrid, amely jól illeszthető a kukoricatermesztési vetésszerkezetbe.

- Korai virágzás: előnyös tulajdonság lehet a nyári hőstressznek kitett időszakokban.
- Jó hő- és aszálytűrés: változó vízellátottság mellett is ígéretes termőhelyi alkalmazkodóképesség.
- Erőteljes gyökérzet: hozzájárul a víz- és tápanyagfelvételhez.
- Harmonikus vízleadás: fontos szempont a betakarítás és a szárítás tervezésekor.
- Csávázott vetőmag: a vetőmag előzetes kezelése a csomagoláson feltüntetett készítmény és előírások szerint történik.

Termesztési szempontok – így alapozd meg a jó termést

Az INALTERA genetikai adottságainak kihasználásához igazítsd a termesztéstechnológiát a termőhely vízgazdálkodásához, tápanyag-ellátottságához és a várható terméssszinthez. Készíts egyenletes, megfelelő nedvességű magágyat, és ügyelj az optimális vetésmélységre, valamint az egyenletes tőeloszlásra. A tőszámot ne kizárólag a hibrid alapján határozd meg: vedd figyelembe a talaj vízellátottságát, a termőhely termőképességét és a termesztési intenzitást is.

A gyomirtási, növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási programot a terület adottságaihoz igazítsd. A betakarítás időpontját a szem nedvességtartalma, a betakarítási kapacitás és a szárítás költségeinek figyelembevételével tervezd meg.

Ha középkorai, jó alkalmazkodóképességű, korai virágzású és kedvező vízleadású szemes kukoricahibridet keresel, az INALTERA érdemes a figyelmedre. A SAATEN-UNION hibridje eltérő termesztési körülmények között is ígéretes eredményeket mutatott, így a termőhelyhez igazított technológiával a gazdaságod kukoricatermesztési rendszerének értékes eleme lehet.

Válaszd az INALTERA csávázott kukorica vetőmagot, ha FAO 390-es, jó hő- és aszálytűrésű, sokoldalúan termeszthető hibriddel szeretnéd fejleszteni a vetésszerkezetedet.

PRIMAG
1991