Kamaria csávázott

Ajánlás: szemes

AÖP: AÖP

Csávázás: csávázott

Nemesítő: Marton Genetics

Státusz: Előrendelhető

Tenyészidő: FAO300-399

TERMŐKÉPESSÉG

- Minden termőhelyen és minden évjáratban átlagot messze meghaladó termésszintet várhatunk tőle.
- A minősítés éveiben elért eredményei:
- 12,91 t/ha termés - 6,7%-kal magasabb a sztenderd hibridek termésátlagánál.
- Kiegyenlítetten terem, két különböző évben a KAMARIA terméskülönbsége között nem volt jelentős eltérés.
- Szemhozama hasonló volt, mint a kísérletben szereplő FAO 400-as átmenő sztenderd, attól lényegesen alacsonyabb betakarítási szemnedvességgel.
- A 2012. évi üzemi kísérletben Hajdúnánáson a Kamaria 13,6 t/ha termést adott 17,2% átlagos betakarítási szemnedvességgel.A kiemelkedő termőképességet az is jellemzi, hogy sok helyen a szemtermés meghaladta a 11-12 tonnát hektáronként.
- Hajdú-Bihar megyében a 2012-es évben 9 t/ha hozam mellett 14,1%-os szemnedvességet mértek, közel 1000 ha átlagában.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG

- Vízleadása gyors, az érés utolsó időszakában a legintenzívebb.
- A 2011. évi vizsgálatainkban a Kamaria szeptember első dekádjának végére elérte a technikai érettséget jelentő 20%-os szemnedvességet, szeptember végére pedig már 15% körüli értékre leszáradt.
- Tipikusan a korai tenyészidőcsoport utolsó harmadában érő hibrid.
- A Kamaria éréskor fellazuló csuhélevelei, továbbá a relatív magas szemfelülete nagyban segítik az alacsony betakarítási szemnedvesség elérését.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI

- Közepes magasságú, jó szárszilárdságú és állóképességű,magas kiegyenlítettséget mutató hibrid.
- A vizsgálati években a szárszilárdsági hibája mindössze 1,5%-ot ért el, egyike volt a legjobb szárú korai hibrideknek.
- A cső nagyon generatív, az összes szárazanyagának 87-88%-át a szem szárazanyaga

képviseli. Betakarításkor szemveszteség nélkül, nagyon könnyen morzsolható.
- A csövek végig termékenyülnek, szemsorainak száma 18,esetenként 20, soronként 38-40 szemmel
- A szemek palástja világossárga, az állomány színe jellegzetesen világosabb zöld.
- Kezdeti fejlődési erélye kiváló.
- A Debreceni Egyetem vetés időreakció-vizsgálatai alapján az optimális vetésidő április második felére javallott.
- A tápanyag-reakciók alapján a 240 kg/ha feletti hatóanyag dózisokat kiemelkedő terméssel hálálja meg.
- Hektolitertömege az intézeti vizsgálatokban 70 kg feletti volt.
- Ajánlott tőszám: 60-70 000 ezer tő/ha

Jó termőhelyi körülmények és intenzív termesztéstechnológia mellett a magasabb tőszám használata javasolt. Magas színvonalú gazdálkodás esetén a növekvő műtrágyaadagokra kiugróan magas termésekkel reagál. A Kamaria, mint korai hibrid az ország minden kukoricatermő vidékén termelhető.

PRIMAG
1991