LID Snaps csávázott

Ajánlás: siló

Csávázás: csávázott

Nemesítő: Lidea

Státusz: Előrendelhető

Tenyészidő: FAO500-599

SNAPS silókukorica hibrid – Lidea | FAO 570–590

Késői érésű silókukorica a nagy zöldtömeg és a magas szárazanyag-termés céljára

A SNAPS a Lidea nemesítőház új generációs, késői éréscsoportba tartozó silókukorica hibridje, amelyet elsősorban nagy tömegű, jó minőségű szilázs előállítására választhatsz. A FAO 570–590 érésidejű hibrid a hosszabb tenyészidő lehetőségeit kihasználva kínál megoldást azoknak a gazdaságoknak, amelyek a tömegtakarmány-termelésben magas terméspotenciálra törekednek.

A megfelelő termőhelyen és termesztéstechnológia mellett a késői silóhibridek fontos szerepet tölthetnek be a nagy hozamú szarvasmarha-állományok tömegtakarmány-ellátásában. A SNAPS választásával a silókukorica-termesztésben a nagy biomassza előállítására helyezheted a hangsúlyt.

Miért válaszd a SNAPS silókukoricát?

- Új Lidea genetika: a nemesítőház új fejlesztésű silókukorica hibridje.
- Késői éréscsoport: FAO 570–590 érésidő, hosszú tenyészidejű termesztési lehetőségekkel.
- Silóhasznosítás: elsősorban tömegtakarmány és kukoricaszilázs előállítására.
- Nagy termelési potenciál: a késői éréscsoport lehetőségeinek kihasználása a biomassza-termelésben.
- Állattenyésztési felhasználás: a szarvasmarha-állományok tömegtakarmány-ellátásának egyik lehetséges genetikai alapja.

Kinek ajánljuk a SNAPS hibridet?

A SNAPS silókukoricát elsősorban azoknak a tejtermelő és húsmarhatartó gazdaságoknak ajánljuk, amelyek saját előállítású kukoricaszilázzsal szeretnék biztosítani állatállományuk tömegtakarmány-szükségletét.

A késői FAO 570–590 éréscsoport miatt különösen fontos a termőhelyi adottságok, a tenyészidő hossza és a betakarítás tervezett időpontjának figyelembevétele. A hibrid termesztését olyan területeken célszerű előnyben részesíteni, ahol a hosszabb tenyészidő biztonságosan kihasználható.

Mire figyelj a silókukorica termesztésekor?

A kiváló minőségű kukoricaszilázs előállításához nem elegendő a nagy zöldtömeg. A betakarítás időpontját a növény szárazanyag-tartalmához és a szemek fejlettségéhez kell igazítani.

A megfelelő silózási időpont megválasztása alapvetően meghatározza a készülő takarmány erjedési folyamatait, tárolhatóságát és takarmányozási értékét. A betakarítás során törekedj az egyenletes szecskaméretre, a megfelelő tömörítésre és a légmentes lezárásra.

A SNAPS hibrid termesztésénél is a termőhelyhez igazított vetésidő, a kiegyensúlyozott tápanyagellátás és a szakszerű betakarítás együttesen alapozza meg a sikeres silókukorica-termesztést.

SNAPS – új Lidea silókukorica genetika a késői éréscsoportban, a nagy tömegtakarmány-termelés szolgálatában.

Válaszd a Primag kínálatából a SNAPS hibridkukoricát, és tervezd tudatosan gazdaságod tömegtakarmány-termelését!

PRIMAG
1991