MV Koppány csávázott

Ajánlás: szemes

AÖP: AÖP

Csávázás: csávázott

Nemesítő: Marton Genetics

Státusz: Előrendelhető

Tenyészidő: FAO400-499

TERMŐKÉPESSÉG

- Remek teljesítményt nyújt a kedvező csapadékellátottságú évjáratokban. Aszályos években is átlag feletti terméseredményre képes, bárhol megállja a helyét.
- Korrelációtörő típus, tenyészidejéhez képest magasabb terméspotenciállal rendelkezik.
    - 13,19 t/ha átlagtermés - a minősítés évében
    - 12,80 t/ha üzemi termés - 2011-es évben (Fejér megye)
    - 12,42 t/ha termés üzemi kísérletben- 2012-es évben (Kaba)
- A korábbi évek rendkívüli időjárásaiban is bizonyította átlag feletti termőképességét, ami jó vízleadással párosult.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG

- Vízleadása gyors, augusztus utolsó harmadától október elejéig tartó érési időszakra számítva a napi vízleadása meghaladja a 0,6%-ot.
- A kukoricára kedvező évben korán, szeptember végére biztonságosan 20%-os szemnedvességig leszárad. A 2012-es extrém száraz évben már szeptember közepére elérte a 15-20% közötti szemnedvességet.

MINŐSÉG, BELTARTALOM

- Hektolitertömege magas, több termőhely átlagában 76 kg értéket mutatott az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetének mérései szerint.
- Keményítőtartalma kiemelkedő, az intézeti vizsgálatok szerint 73,3% a termőhelyek

átlagában.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI

- Korai virágzás jellemzi, jól termékenyül. A csővégi szemek is berakódnak.
- Szemsorszáma 16-18 közötti, a soronkénti szemszáma 42-44.
- A cső szárazanyagából 85% a szemek aránya.
- A minősítő kísérletekben a szárszilárdsági hibája 1,5% volt, szemben a sztenderdek 3,5%-os átlagértékével.
- Időben, április második dekádjától kezdve vethető. Ebben az esetben a biológiai érése nyugodt körülmények között történik, a szemek kitelnek. Az eredmény magas termés,alacsony szemnedvességgel.
- Jól reagál a növekvő tápanyag mennyiségekre, a 100-120kg/ha N hatóanyagot kiemelkedő terméssel honorálja. Jól reagál az öntözésre is.
- A Debreceni Egyetem 2012-es tápanyag reakciókísérleteiben a 320 kg/ha tápanyagdózisra reagált a legmagasabb terméssel.
- Ajánlott tőszám: 60-70 000 tő/ha.

Tőszámvizsgálatainkban az Mv KOPPÁNY termése a 70 000 tő/ha körüli szintnél elérte a maximumát. E szint fölé jó termőhelyi adottságok mellett se sűrítsük!

Kiváló alapanyaga a bioetanol-gyártásnak. Azon kukoricatermő körzetekbe ajánljuk, ahol a korai FAO 400-as hibridek biztonsággal termelhetők.

PRIMAG
1991