SY Electron Elevation Plus csávázott+rovarölő +stimulátor

Ajánlás: szemes

Csávázás: csávázott+rovarölő +stimulátor

Kezelés: Elevation Plus

Nemesítő: Syngenta

Státusz: Előrendelhető

Tenyészidő: FAO300-399

Erektív levélzetű, nem hagy nagy származadvány, kifejezetten generatív típusú hibrid. Hosszú, megnyúlásra képes csőtípussal bír és magas szemsorszámából eredően nagy teljesítményre hivatott. A független és saját vizsgálataink alapján kifejezetten ajánljuk kalászos gabonák elővetemények, anélkül, hogy le kellene mondani a magas termésről. Gyors vízleadása révén az elsők között lehet megkezdeni a betakarítását, kihasználva a szezon előtti sokszor kedvezőbb felvásárlási árakat.

Agronómiai jellemzők és termesztési ajánlások

- Csőtípus és csőfelépítés: SY Electron flex típusú csöveket nevel, és a szemsorok száma 18–20 körül alakul. Ez a fajta szerkezet hozzájárul a jó szemkitöltéshez és potenciálisan magas terméshozamhoz.
- Kezdeti fejlődés, alkalmazkodóképesség: A hibrid gyors kezdeti fejlődéssel rendelkezik; ez pozitív, ha a vetés tavasz végi, talajhőfok- vagy nedvesség-viszonyai nem ideálisak. Emellett jó alkalmazkodóképességet és stressztűrést mutat.
- Tápanyagigény és álláserősség: A tápanyagigény „közepes–magas” kategóriába sorolt; ajánlott termőtőszám: 68 000–82 000 tő/ha.Ez arra utal, hogy a hibrid intenzívebb műtrágyázás mellett (vagy legalább megfelelő tápanyag-ellátás esetén) igazán jól teljesíthet.
- Éréskori tulajdonságok – vízleadás és betakarítás: SY Electron gyors vízleadással jellemezhető — így az érés végén viszonylag gyorsan szárad, és korábban aratható, ami értékes előny, különösen korai betakarítású vetések, illetve kalászos elővetemény esetén.
- Generatív típus, származadvány: A fajta generatív típusú növényfelépítéssel bír — nem hagy jelentős származadványt, ami előnyös lehet vetésforgós rendszerekben, különösen ha kalászos követi a kukoricát.

SY Electron különösen ajánlott

- olyan gazdaságoknak, amelyek korai érésű kukoricát keresnek, és fontos számukra a kalászos elővetemény utáni gyors tábla-ürítés;
- talajok vagy termőhelyek tekintetében közepes-közepes-közepesen kedvező adottságú területekre, ahol nem feltétlenül tervezett intenzív műtrágya-reagálás, de stabil szemtermés a cél;
- dárögzött vetési idővel, gyors keléssel és megbízható kezdettel — pl. korai vetés, tavaszi

időjárás ingadozása esetén;
- olyan vetésforgós rendszerekben, ahol a származadvány minimális, és a következő kultúra (pl. kalászos) optimálisan követi a kukoricát.

PRIMAG
1991