

## Bonfire egyéves csávázatlan I. fok

**Ajánlás:** zöldtakarmány

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Életciklus:** egyéves

**Érésidő:** korai

**Norma:** 80-100 kg/ha

**Státusz:** Előrendelhető

**Szap. fok:** I. fok



A BONFIRE zöldrözs ideálisan hasznosítható **tömegetakarmányként a tejtermelő tehenészetekben** illetve **biogáz** előállítására is.

A fajta nagyon gyors növekedési eréllyel bír az őszi és a tavaszi vegetációs időszakban is.

Összehasonlítva más fajtákkal a legkorábban lehet betakarítani - így fővetésben lehet utána tavaszi áru vagy takarmánynövényeket illeszteni a vetésforgóba - ami nagy előnnyel bír a többi rozsfajtaához képest.

Nagy - **20-30 to/ha** - fonnyasztott hozamra képes, magas fehérje, cukor és energiatartalom jellemzi, könnyen emészthető strukturális rosttartalom mellett.

- gyors talajtakarás ősszel, ezzel óvják a talajt az erózió és defláció káros hatásaitól
- tápanyagok megőrzése
- jól hasznosul a téli nedvesség
- nincs gyomosító hatás
- a rendelkezésre álló föld, mint erőforrás jobb kihasználása
- fővetésben tavaszi áru- és takarmánynövények egyaránt vethetőek utána
- termesztésük jól gépesíthető, nem igényel pótlólagos beruházást, mivel a szükséges gépek és berendezések rendelkezésre állnak

Termesztési információk:

Termőhely

Minden talajtípuson eredményesen termeszthető. Szeptember elejétől október végéig.

Vetési idő

Szeptemberi vetéstől magasabb hozamok várhatóak az intenzívebb bokrosodás miatt.

Vetésmélység

2-3 cm

Tápanyag igény

P2O5: 80 kg/ha, K2O: 200kg/ha,

Betakarítás ideje

N:100 kg/ha

Betakarítás

Az első kalászek megjelenése után (április közepétől) állati takarmányozásra: praktikusabb 2 menetben, fonnyasztással

Hozam

biogáz felhasználásra: lehet 1 menetben is, fonnyasztás nélkül  
Rövid, 45-60 napos tavaszi vegetációs idő jellemzi.  
A napi szárazanyaghozam kb. 85 kg/ha, 15-25 t/ha várható zöldhozam.



P R I M A G

— 1991 —