

Bovital BMR csávázatlan

Csávázás: csávázatlan

Érésidő: középkorai

Jellemző: kiemelkedő emészthetőség

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: I. fok



A Bovital BMR egy korszerű, takarmányozási célra nemesített szudánifű (*Sorghum sudanense*) fajta, amely a BMR (Brown Midrib – barna főér) genetikai tulajdonságnak köszönhetően kiemelkedő emészthetőséget és takarmányértéket biztosít. A lignintartalom csökkent szintje javítja a rostok feltárhatóságát, ezáltal növeli a bendőben hasznosuló energia mennyiségét, ami különösen előnyös a nagy teljesítményű tejelő és húshasznú állományok takarmányozásában.

A fajta erőteljes kezdeti fejlődésű, gyors talajborítást ad, és kedvező körülmények között intenzív zöldtömeg-termelésre képes. Növekedési típusa középmagas, finom-középfinom szárú, magas levélhánnyal, ami hozzájárul a jó emészthetőséghez és a kiváló takarmányminőséghez. Sarjadóképessége jó, így többkaszálásos hasznosításban és legeltetésben is megbízhatóan teljesít.

A Bovital BMR egyik legfontosabb előnye a hagyományos szudánifű fajtákhoz viszonyított jobb NDF-emészthetőség és nagyobb takarmányfelvételi potenciál. A BMR tulajdonság miatt a növény rostfrakciója könnyebben lebomlik, ami javítja a tejtermelési és tömeggyarapodási eredményeket. Emellett a fajta jó szárazságtűréssel rendelkezik, így a nyári takarmányhiány áthidalására, másodvetésben vagy aszályos térségekben is biztonsággal termesztendő.

Fő agronómiai jellemzők

- típus: BMR szudánifű
- érésidő: középkorai
- növekedési erély: gyors
- szárvastagság: finom-középfinom

- levélarány: magas
- sarjadóképesség: jó
- szárazságtűrés: jó
- **takarmányminőség: kiemelkedő emészthetőség**

Termesztési javaslat

- Vetése akkor ajánlott, amikor a talaj hőmérséklete tartósan meghaladja a 12-14 °C-ot (általában április vége-május).
- Javasolt vetőmagnorma 25-35 kg/ha, intenzív termesztésben 35-40 kg/ha.
- A legjobb takarmányminőség érdekében a kaszálás 70-90 cm növénymagasságnál célszerű, 6-8 cm tarlómagasság meghagyásával az újrasarjadás biztosítására.

A Bovital BMR ideális választás azoknak a gazdaságoknak, amelyek a nyári zöldtakarmány-bázisukat magas emészthetőségű, jól hasznosuló tömegtakarmánnyal kívánják stabilizálni, különös tekintettel a nagy teljesítményű kérődző állományokra.

Miben más a Bovital a Bovital BMR-hez képest?

A legfontosabb különbség a lignintartalom és az emészthetőség.

Bovital (nem BMR)

- hagyományos ligninszint
- robusztusabb szár, jobb állóképesség
- általában nagyobb és stabilabb zöldhozam
- üzembiztos, stressztűrő
- takarmányminőség: jó

Bovital BMR:

- csökkent lignintartalom (Brown Midrib gén)
- lényegesen jobb rost-emészthetőség
- nagyobb takarmányfelvétel és tejtermelési potenciál
- kissé érzékenyebb állóképességben
- takarmányminőség: kiemelkedő

Gyakorlati választási irány

- Maximális tejtermelés, prémium takarmányminőség → Bovital BMR

- Nagy tömeg, üzembiztonság, robusztus állomány → [Bovital](#)



P R I M A G

— 1991 —