

Bovital csávázatlan

Csávázás: csávázatlan

Érésidő: korai

Jellemző: nagy zöldhozam

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: I. fok

- Egyik legkiválóbb álló- illetve termőképességű hibrid a piacon.
- Szára vékony, szilárd, 160-210 cm magas.
- A szár-levél aránya kedvező, fejlődése gyors, sarjadóképessége kiváló.
- Vetéstől a bugahányásig eltelt napok száma 74-76 nap.
- Az ország egész területén eredményesen termeszthető hibrid.
- Intenzív körülmények között 2-3 hasznosítást tesz lehetővé, termőképessége 80-120t/ha zöld- illetve 20-25 t/ha szárazanyag.
- Kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken az aszályos július-augusztus hónapokat is kitűnően tűri, nagy mennyiségű zöldtömeg növelésére képes.
- Zöldhozamának, viszonylagos igénytelenségének, beltartalmi értékeinek köszönhetően kitűnő bioenergetikai (biogáz) alapanyag is.

Tápanyag - N (60-80 kg), P (60 kg), K (40-50kg) Az első hasznosítás után 40 kg nitrogen hatóanyag alkalmazása nagyban segíti a regenerálódást

Vetés - 12 C fokos talajhőmérséklettől, 4-5 cm-es mélységbe, gabona vagy dupla-gabona sortávolságra (hasznosítástól függően)

Növényvédelem - PRE (EPOST) - 300g/l petoxamid+187,5g/l terbutilazin 2,0-3,0l/ha POST - bromoxinil hatóanyagú készítmények A megfelelő hatóanyagok és dózisok egyénileg, táblára vonatkoztatva határozhatóak meg!
A hormonhatású készítmények alkalmazása termékenyülési problémákat okozhatnak!

Norma/ha :

- ZÖLDETETÉS - 1,0-1,2 millió csíra
- SZÉNA KÉSZÍTÉS - 1,5-1,7 millió csíra
- SILÓ KÉSZÍTÉS - 1,0-1,2 millió csíra
- LEGELTETÉS - 0,8-0,9 millió csíra

Betakarítás

- ZÖLDETETÉS - 28- 30%-os szárazanyag tartalomnál (bugahányás kezdete)

- SZÉNA KÉSZÍTÉS - 28-30%-os szárazanyag tartalomnál (bugahányás kezdete)
 - SILÓ KÉSZÍTÉS
 - Húsmarha állomány részére a betakarítás 28-30%-s szárazanyagtartalomnál a legideálisabb, míg tejlóknek a szem tejesérésében.
 - LEGELTETÉS - 40-45cm-es növénymagasság-tól.



P R I M A G

— 1991 —