Sherkan BMR csávázatlan

Csávázás: csávázatlan

Érésidő: középérésű

Jellemző: bicolor

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: hibrid

Többszöri kaszálásra (2-3), szenázs és szénakészítésre alkalmas, magas fehérjetartalmú, jól emészthető, jó szárazságtűrésű hibrid.

- Vékonyszálú, szudáni x bicolor hibrid
- Éréscsoport: közepes.
- Virágzás: 60 napra.
- Típus: BMR.
- Kaszálások száma: Többször kaszálható. Az első kaszálás után nagyon bokrosodik és még vékonyabb szálakat növeszt. Ezért a második kaszálás még inkább megfelel a szánakészítésre. Legjobb esetekben, amikor minden feltétel megfelel (időjárási viszonyok főképpen), időben van kaszálva, akkor akár még 4x is.
- Ezermagtömeg: 15-18g.
- Hektár dózis: 15 kg, széna készítésre 20 kg/ha mennyiséget javaslunk.

Mit jelent a bicolor kifejezés?

- cirok genetikai hátteret is hordoz, ami általában:
    - nagyobb termőképességet ad
    - erősebb szárat biztosít
    - jobb szárazságtűrést ad
    - magasabb cukortartalmat eredményezhet
- miközben a szudánifűtől örökli:
    - gyors kezdeti fejlődést
    - jó sarjadóképességet
    - finomabb szárat (jobb emészthetőség)

Jellemzői

- Kismagvú és vékony szárú fajta
- Kivételes takarmányhozam és minőség
- Kiváló meleg- és szárazságtűrés
- Gyors fejlődés (a tenyészidőszak elején is) és újra sarjadási képesség
- Szenázshoz és szénához is egyaránt megfelelő
- Legeltethető
- Magas fehérjetartalom

- A Sherkan általában a vetés után 45-55 nappal válik betakaríthatóvá. A fehérje mennyisége csökken a betakarítás késésével, de az energia növekedni fog a cirok szárában és levelében történő folyamatos cukorképződés, valamint a fejlődő szemekben végbemenő szénhidrát beépülés miatt.
- Gyorsan fonnyasztható/száradó hibrid, így olyan területeken is használható, ahol más szudánifüvekelhelyezése problémás lehet.

Vetés: május elejétől júliusig, 15 fokos talajhőmérséklettől Betakarítása a keléstől kb. 45-50 nap múlva, 90-110 cm-es
magasságban.

PRIMAG
1991