IS Flavius csávázott II. fok

Ajánlás: abrak

Csávázás: csávázott

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: II. fok

Vetésidő: ősz

- Az IS Flavius korai érésű, kimagasló termőképességgel és jó termésstabilitással rendelkező őszi tritikálé fajta.
- Bokrosodóképessége jó, fagyállósága megbízható. Közepes termetű, szára merev, megdőléssel szembeni ellenállósága kiváló.
- Magas fokú levélrozsda rezisztenciával rendelkezik, lisztharmatra és a sárgarozsda új rasszaira azonban közepesen fogékony.
- Alkalmazkodó képessége kiváló, termése kisparcellás kísérletekben meghaladhatja a hektáronkénti 12,5 tonnát.
- A fajta előnyei
- Koraiság
- Kiváló termőképesség
- Megbízható állóképesség
- Kiemelkedő takarmányozási érték
- Termőképesség:
- közepes intenzitás: 8,3-10,5 t/ha
- magas intenzitás: 9,4-12,5 t/ha
- Agronómiai tulajdonságok
- bokrosodóképesség: jó
- növénymagasság: 110-115 cm
- éréscsoport: korai
- télállóság: jó
- állóképesség: kiváló
- optimális vetésidő: szept. 25.- okt. 15.
- kései vetés: kevésbé alkalmas
- vetés gabona után: alkalmas
- Minőség:
- takarmány
- EMT: 51-54 g
- fehérjetartalom: 11,2-12,5 %
- keményítő tartalom: 69,9%
- esésszám: 100-250 sec.
- zöldtömeg termés. 40-50 t/ha
- Betegség-ellenállóság
- lisztharmat: 10/5
- levélfoltosság: 10/6

- levélrozsda: 10/8
- sárgarozsda: 10/5
- szártőbetegségek. 10/8
- kalászfuzariózis: 10/7
- Termesztési javaslatok:
- Az IS Flavius a gyengébb termesztési feltételeket jobban tolerálja, mint az őszi búzák.
- Az alacsony vagy túl magas pH-értékű talajokon is eredményesen termeszthető.
- Sekély termőrétegű talajokon is vethető, de a fajtában rejlő terméspotenciál csak a jobb talajokon,
- Intenzív termesztéstechnológia mellett tud igazán megmutatkozni.
- A fajta minősítésekor komplex betegség-rezisztenciával rendelkezett, az utóbbi években azonban érzékenyen reagált lisztharmat és sárgarozsda fertőzésre.
- Erős infekciós nyomás esetén ajánlott az állományokat gombaölő szerrel kezelni már a bokrosodás stádiumában.
- Az IS Flavius takarmányozási értéke kiváló, magasabb mint a búzafajtáké.

PRIMAG
1991