

MV Hópehely csávázott II. fok

Csávázás: csávázott

Státusz: Elfogyott

Szap. fok: II. fok

Vetésidő: őszi

Az őszi zab, annak ellenére, hogy termesztésével régóta próbálkoznak, a gyakorlatban eddig még nem terjedt el nagyobb területen. Ha áttelel, akkor akár 30-40%-kal is nagyobb termést várhatunk tőle, mint a tavaszi életformától, természetesen egyszer többet, másszor kevesebbet.

Nagyobb az őszi zab előnye, ha a tavaszi zabra száraz tavasz jön, kisebb, ha fagykárt szenved az ősszel vetett állomány. Az eddigi tapasztalatok alapján – a hazai téli időjárási körülményeket figyelembe véve – áttelelő képessége az őszi káposztarepcénél valamivel jobb, azonban kiváló bokrosodóképességének köszönhetően az esetleges növényszámritkulást a hajtásszám növelésével kompenzálni tudja.

E mellett az őszi vetésű zab jobban hasznosítja a talaj nedvességét és kevésbé szenved a tenyészidőszak végén fellépő szárazságtól. Az elmúlt években a martonvásári tenyészterekben az ilyen fagyállósággal rendelkező genotípusok nagyobb fagykár nélkül teleltek át.

E fajta kiváló termőképessége jó beltartalmi értékekkel párosul. Nyersfehérje-tartalma 11,9% és 14,6% között, pelyva nélkül mért β -glükán tartalma 3,1% és 4,5% között alakult a martonvásári kísérletekben.

Erősen bokrosodó, jó állományképző, kiváló alkalmazkodóképességű fajta.

A világ fontosabb őszi zabtermesztő körzeteiből származó, Martonvásáron vizsgált genotípusok között a jobb fagyállóságúak közé sorolható, ami megközelíti a közepes fagyállóságú őszi árpa szintjét.

Az Mv Hópehely jó állományképző képességének köszönhetően tavasszal erőteljes bokrosodásával kompenzálni tudja az esetleg fellépő növényszám-ritkulást

A különböző kórokozókkal szemben jó a szántóföldi ellenállósága. Megfelelő termesztéstechnológia és kedvező agroökológiai körülmények között ezzel a fajtával a tritikálé szemtermés-mennyiségét el lehet érni.

Fajtainformáció:

- Életforma: őszi
- Optimális vetésidő: (X. 13-20.)
- Jellemző minőség: étkezési/takarmány
- Jellemző ezermagtömeg 33-37 gramm
- Hektoliter tömeg 51,8-53,0 kg/100 l
- Nyersfehérje-tartalom (sza.) 11,9-14,6 %
- β -glükán tartalom 3,1-4,5 %



P R I M A G
— 1991 —