

MV Pehely csávázott II. fok

Csávázás: csávázott

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: II. fok

Vetésidő: tavasz

E fajta jó termőképessége kiváló agronómiai tulajdonságokkal párosul. Állóképessége a jelenleg köztermesztésben lévő fajták között a legjobb.

E tulajdonsága lehetővé teszi az intenzív termesztését. A faj igényét meghaladó műtrágya ellátás esetén sem dől meg és kiváló potenciális beltartalmi tulajdonságai (fehérje és β -glükán tartalma) is érvényesíthetők.

Jól bokrosodó és kiváló alkalmazkodóképességű fajta. Évjáráttól függően a standard fajták átlagánál pár cm-rel alacsonyabb, ezermagtömege pedig 2-3 grammal több.

Lisztharmattal szembeni ellenálló képessége kiváló, koronarozsdával a standardok átlagánál kisebb mértékben fertőződött provokációs kísérletben.

| | |
|---|--------------|
| Potenciális termőképesség [t/ha] | 6,0-7,0 t/ha |
| Minőség | takarmány |
| Agronómiai tulajdonságok | |
| Ajánlott csíraszám [csíra/m ²] | 400-450 |
| Jellemző ezermagtömeg [gramm] | 29-33 |
| Optimális vetésidő | III. 1-15. |
| Télállóság | - |
| Bokrosodóképesség | jó |
| Bugahányás átlagos időpontja | VI. 8-9. |
| Növénymagasság [cm] | 75-100 |
| Állóképesség (9=kiváló) | 9 |
| Fajtára jellemző minőségi értékek | |
| A szemtermés fizikai és összetételi jellemzői | |
| Hektoliter tömeg [kg/100 l] | 45,5-50,2 |
| Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] | 10,3-15,3 |
| β -glükán tartalom [%] | 3,7-5,0 |