

Vadrezeda-Reseda lutea csávázatlan

Ajánlás: zöldugar/ méhlegelő

Csávázás: csávázatlan

Életciklus: 6-8 év

Norma: 10-15 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Vetésidő: ősz

Vadrezeda (Reseda lutea) - természetes vadvirágos faj szárazabb területekre

A vadrezeda (Reseda lutea) őshonos vagy régóta meghonosodott, lágyszárú vadvirágfaj, amely elsősorban szárazabb, napos termőhelyeken, mezsgyéken, utak mentén, parlagterületeken, gyepekben és természetközeli élőhelyeken fordul elő. Jellegzetes, sárgászöld virágzatával és elnyújtott virágzási időszakával értékes alkotóeleme lehet különböző vadvirágkeverékeknek, beporzóbarát magkeverékeknek, méhlegelő célú vetéseknek és természetközeli zöldfelületeknek.

A Reseda lutea jól alkalmazkodik a változó környezeti feltételekhez, és különösen ott lehet értékes faj, ahol cél a természetes hatású, szárazságtűrő és hosszabb távon is fenntartható növényállomány kialakítása. Vadvirágos keverékben nem feltétlenül a látványos, nagy virágú fajok szerepét tölti be, hanem természetes megjelenésével, sajátos habitusával és ökológiai értékével gazdagítja az állományt.

A vadrezeda jellemzői

A vadrezeda a rezedaformák családjába tartozó, többnyire két- vagy évelőként viselkedő növényfaj. Kedvező körülmények között hosszabb ideig is fennmaradhat az állományban. Szára felálló vagy felemelkedő, gyakran elágazó, virágai pedig tömött, megnyúlt fürtökben nyílnak.

Virágzása jellemzően a nyári időszakban kezdődik, és megfelelő körülmények között hosszan elhúzódhat. Apró, sárgás vagy sárgászöld virágai nektárt és virágport kereső rovarok számára is táplálékforrást jelenthetnek. Emiatt a faj jól illeszthető olyan növényállományokba, amelyek kialakításánál fontos szempont a biodiverzitás növelése és a beporzó rovarok számára kedvezőbb élőhely kialakítása.

Szerepe vadvirág- és beporzóbarát keverékekben

A Reseda lutea elsősorban természetközeli, fajgazdag vetésekben érvényesül igazán. Jól kombinálható más őshonos vagy természetes élőhelyeken is előforduló vadvirágfajokkal. Különösen alkalmas olyan keverékekbe, ahol nem egy homogén, intenzíven virágzó állomány, hanem egy

változatos szerkezetű, természetes fejlődésű növénytársulás kialakítása a cél.

Felhasználható többek között:

- vadvirágos magkeverékekben,
- beporzóbarát és rovarbarát vetésekben,
- méhlegelő és biodiverzitást támogató keverékekben,
- tájba illő zöldfelületek kialakítására,
- út menti, mezsgye- és puffterületeken,
- szárazabb fekvésű, extenzíven fenntartott területeken,
- természetközeli élőhelyrekonstrukciós vetésekben.

A faj különösen jól illeszkedik olyan vetési koncepciókba, ahol a cél nem kizárólag az első év intenzív virágzása, hanem egy változatos, természetes dinamikával fejlődő növényállomány kialakítása.

Termőhely- és talajigény

A vadrezeda alapvetően fényigényes növény, ezért napos vagy legfeljebb enyhén árnyékos területeken fejlődik megfelelően. Jól alkalmazkodhat a gyengébb adottságú, szárazabb, kövesebb vagy meszesebb talajokhoz is.

Telepítésénél fontos a megfelelő talaj-előkészítés és a gyommentes induló környezet. A vadvirágfajok vetőmagjai általában érzékenyek arra, ha a kelés időszakában gyors növekedésű gyomnövények vagy agresszív kultúrfajok elnyomják őket. Ezért a sikeres telepítés egyik legfontosabb feltétele a gondosan előkészített, gyomoktól lehetőség szerint mentes magágy.

A vetőmagot sekélyen, a vadvirágkeverékekre jellemző technológiával célszerű vetni, majd szükség esetén hengerezéssel biztosítani a megfelelő mag-talaj kapcsolatot. A pontos vetéstechnológia mindig függ attól is, hogy a vadrezeda önállóan vagy más fajokkal összeállított keverék részeként kerül telepítésre.

Miért előnyös az őszi vetés?

A vadrezeda magjai a természetben is ősszel kerülnek a talajra, majd a téli időszak után, kedvező körülmények között csíráznak. Az őszi vetés – jellemzően szeptember végétől novemberig – ezért természetesebb kelési és fejlődési ritmust biztosíthat.

Előnyei:

- a magok átmennek a téli időszakon,
- tavasszal a talajnedvességet jobban kihasználhatják,
- korábbi és egyenletesebb kelés alakulhat ki,
- a növényeknek hosszabb fejlődési idő áll rendelkezésre.

Tavasszal is vethető?

Igen, tavasszal is vethető, különösen március–áprilisban, amikor a talaj már megfelelően művelhető. Tavaszi vetésnél azonban a kelés és a kezdeti fejlődés jobban függ a rendelkezésre álló csapadéktól és a gyomosodástól.

Vetési idő: ősszel szeptember végétől novemberig, illetve tavasszal március–áprilisban vethető. Vadvirágos és természetközeli állományok kialakításánál az őszi vetés általában kedvezőbb, mivel a mag természetes fejlődési ciklusához jobban igazodik.

Többnyire két- vagy évelőként viselkedő faj. A *Reseda lutea* életformája és viselkedése termőhelytől függően változhat. Rövid életű évelő / kétéves jellegű, természetes módon fennmaradó faj.

Miért válaszd a Vadrezeda - *Reseda lutea* fajt?

A vadrezeda jó választás, ha olyan természetes megjelenésű, szárazságtűrőbb és ökológiailag értékes növényállomány kialakítására törekszel, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a táj sokszínűségéhez. Vadvirágkeverékekben fontos szerepe lehet a fajgazdagság növelésében, a természetes növénystruktúra kialakításában és a különböző rovarfajok számára kedvezőbb élőhely létrehozásában.

A *Reseda lutea* vetőmag különösen jól használható olyan területeken, ahol a cél a természetközeli megjelenés, a biodiverzitás támogatása és egy változatos, a helyi környezeti adottságokhoz jól alkalmazkodó vadvirágos növényállomány kialakítása.

