

Eso csávázatlan II. fok

Ajánlás: abrak

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Magszín: sárga

Státusz: Elfogyott

Szap. fok: II. fok

Típus : afila

Vetésidő: tavasz



- sárgamagvú
- tavaszi vetésű
- középérésű
- nagy termőképességű
- szárazborsó (PIL05), tavaszi takarmányborsó (PIL06)

Agronómiai tulajdonságok

- Fehérvirágú, féllevélkés (afila) középérésű fajta.
- Növénymagassága közepes. EMT közpes (256g).
- Jól tolerálja a tavaszi szárazabb viszonyokat és az alacsonyabb hőmérsékletet.
- Nagyon jó állóképesség jellemzi a vegetáció teljes ideje alatt, jó gépi betakarítás tervezhető a fajtával.

Termesztés

- Jó termőképességű talajokon eredményesen termesztendő.
- Célszerű betartania féllevélkés típusú borsó fajtákra jellemző agrotechnikai előírásokat.
- Ajánlatos jó minőségű vetőágy előkészítése.
- A kórokozókkal és kártevőkkel szemben javasolt a védekezés.
- Betakarítás elkezdhető lehetőleg 18%-os nedvességtartalomnál annak érdekében, hogy a magminőség jobb legyen.

Javasolt vetési idő

- Lehető legkorábban tavasszal.
- Vetésmélység: 6-7cm

Termés:

- A nagyobb termőképességű fajtához sorolható, a standard fajtához viszonyítva 105,7%-kal termett többet.

Kórtani jellemzők

Aszkihitás foltossággal (ascochyta pisi) és gyökér megbetegedésekkel (Fusarium spp.) szemben nagy ellenállóképességgel rendelkezik.

Botritiszes megbetegedéssel (Botryotinia fuckeliana), borsórozsdával (Uromyces pisi) és borsó lisztharmattal (Erysiphe pisi) szemben is nagyon jó az ellenálló-képessége. Általánosan betegségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik.

Fajtainformáció

Jellemző ezermagtömeg [gramm]	240-270
Optimális vetésidő	II. 20 - III. 20
Növénymagasság [cm]	100-101
Magtermés jellemzői	
Nyersfehérje-tartalom [%]	22,3-22,9
Keményítőtartalom [%]	50,3-50,7
Magszín egyöntetűsége	kiváló (98,7%)
Tripszin-inhibitor aktivitás (TIU)	3,7-4,4

PRIMAG
— 1991 —