

Impuls csávázatlan II. fok

Ajánlás: abrak

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Magszín: zöld

Státusz: Elfogyott

Szap. fok: II. fok

Típus : afile

Vetésidő: tavasz



Fajtajellemzők:

- Tavaszi zöld magvú kifejtőborsó
- Féllevélkés (afile) típusú
- Zöldmagvú
- Tavaszi vetésű
- Középérésű
- Nagy termőképességű

Agronómiai tulajdonságok:

- A zöldmagvú fajták között a legbőtermőbb.
- Potenciális termőképesség: 5 t/ha, de csapadékosabb vidékeken elérheti a 6-7 t/ha szintet is.
- Magyarország vetőmag-előállításban: 4,4 - 4,7 t/ha
- Zöldmagvú, kerek szemű fajta.
- Magszínének egyöntetűsége kiváló: 97%.
- Fehérjetartalom magas: 23,4-23,9%.
- Keményítő tartalom: 49,3-49,5%.
- Alacsony tripszin-inhibitor aktivitás: TiU 3,6-3,7.
- Fehérvirágú, féllevélkés (afile) típusú középérésű fajta.
- Növénymagassága közepes: 98-100 cm. EMT közepes: 260-280 g.
- Kevés rizikóval természetű, különösen jó állóképességgel rendelkező fajta.

Termesztés:

- Jó termőképességű talajokon eredményesen termesztendő.
- Célszerű betartani a féllevélkés típusú borsó fajtákra jellemző agrotechnikai előírásokat.
- Jó minőségű vetőágy előkészítése ajánlatos.
- A kórokozókkal és kártevőkkel szemben javasolt a védekezés, amikor az indokolt.

- Betakarítás már 18%-os nedvességtartalomnál elkezdhető annak érdekében, hogy a magminőség jobb legyen.

Kórtani jellemzők:

- Aszkohitás foltossággal (*Ascochyta pisi*) és gyökér megbetegedésekkel (*Fusarium spp.*) szemben nagy ellen állóképességgel rendelkezik.
- Botritiszes megbetegedéssel (*Botryotinia fuckeliana*), borsórozsdával (*Uromyces pisi*) és borsó lisztharmattal (*Erysiphe pisi*) szemben is nagyon jó az ellenálló-képessége.
- Általánosan betegségekkel szemben nagyon jó ellenállósággal rendelkezik.

Javasolt vetési idő:

- Tavasszal a lehető legkorábban.

Vetés mélység:

- 6-7 cm

Fajtainformáció

Típus	féllevélkés
Mag színe	zöld
Virág színe	fehér
Termőképesség Mo-on [t/ha]	4,5-5,0
Jellemző termesztési cél	étkezési/takarmány

Agronómiai tulajdonságok

Érésidő	középérésű
Jellemző ezermagtömeg [gramm]	260-290
Optimális vetésidő	II. 20 - III. 20
Növénymagasság [cm]	97
Állóképesség	jó

Magtermés jellemzői

Nyersfehérje-tartalom [%]	23,4-23,9
Keményítőtartalom [%]	49,3-49,5
Magszín egyöntetősége	kiváló
Tripszin-inhibitor aktivitás (TIU)	3,6-3,7