

Rea szösös csávázatlan I. fok

Ajánlás: zöldtakarmány

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 40-60 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: I. fok

Típus : szösös

Vetésidő: őszi



Magas fehérjetartalmú pillangósvirágú takarmánynövény. A pillangósvirágúak gyökerein nitrogéngyűjtő gümők helyezkednek el, emiatt kiválóan alkalmas zöldtrágyázáshoz. Ezenkívül takarmánycént is adhatjuk állatainknak.

Termőhelye a szárazabb területek, mint a rétek, kaszálók, de erdőszéleken és bokros területeken is találkozhatunk vele.

Vékony, felálló szára többnyire a szomszédos növényekre támaszkodik a kapaszkodást segítő kacsokkal, amik a levelek végén találhatók.

Ebből kifolyólag leginkább rozssal vagy búzával vetik.

Nagyon jó hidegtűrő. Mélyen gyökerezik, ezáltal szárazságtűrő. Keverten érdemes vetni, a C:N arány csökkentésében meghatározó szerepet játszik, ugyanis terminálás után gyorsan lebomlik. A szösös bükköny magkötése gyenge, viszont a talajra nem igényes, mert élelmes növény.

Jelentősége:

- Nitrogénkötés
- Talajjavítás
- Erózióvédelem
- Szárazságtűrés
- Hidegtűrés
- Vízmegtartás

Magja rendkívül ellenálló, a talajban hosszú ideig, akár 5-10 évig is fenntarthatja csírázóképességét és gyomként jelenhet meg a területen.

Az állomány tavaszi megsemmisítését ezért körültekintően kell megtervezni.

Ősszel vethető (augusztus közepétől szeptember közepéig), a tavaszi időszakban a főnövény vetése előtt 2-3 héttel kell terminálni

Vetése történhet gabonavetőgéppel (15-20 kg/ha 2,5-3 cm mélyen) vagy szórva vetéssel (20-30 kg/ha).

Intenzív növekedése csak a tavaszi felmelegedéssel indul meg (ekkor viszont akár minden héten meg tudja duplázni a biomassza tömegét), általában május 3. hetében kezd virágozni, ekkorra éri el a nitrogénfelvétel csúcsát, így nincs értelme tovább megtartani.

Az állományt tárcsázhatjuk, illetve vegyszeres úton is megszüntethetjük. Gyomirtás esetén a glifozátra és a 2,4-D-re vagy a kukorica gyomirtó szereire (pl. dikamba hatóanyag) támaszkodhatunk. A vegyszeres terminálás után 1-2 hét várakozási idő javasolt, valamint ennyi idő a bükköny maradványainak is kell a megfelelő kiszáradáshoz, ami már nem akadályozza a vetést. Virágzás idején csak hengerezés javasolt.

A porhanyós, közepesen tápanyag-ellátottságú talajokat kedveli, optimális pH tartomány 6,0-7,5. A foszfortrágyázást meghálálja.

A tavaszi bükkönyhöz (*Vicia sativa*) képest nagyobb a tűrőképessége a tömörödött, gyengébb talajokkal szemben.

A bükköny nemzetségben a szöszös bükköny viseli el leginkább a talaj savas kémhatását.

