

Pascia csávázatlan standard

Ajánlás: étkezési/abrak

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Magszín: világos

Státusz: Rendelhető

Szap. fok: standard konstans fajta

Egyéves, lágyszárú, pillangós virágú növény.

A növény magassága virágzáskor 60-70 cm.

A magja közepes nagyságú, maghéjszíne világosbarna.

A mag alakja lekerekített és sima felületű.

A hüvelytermésben általában két mag fejlődik. Desi típusú, apróbb magvú(igénytelenebb).

Magja nem zsizsikesedik.

A növény nem dől meg, kombájnnal aratható.

Szára mirigyszőrös, ezért takarmányozásra nem megfelelő, viszont zöldtrágyának kiváló.

Étkezésre és takarmányozásra alkalmas magtermése.21-22 % fehérjét. 55-56 % szénhidrátot tartalmaz.

Fogyaszthatjuk frissen zölden, vagy kiszárítva, mint a szárazbabot.

Ha nem frissen készítjük el, akkor a kiszáradt magokat éjszakára áztassuk be.Jobb az emészthetősége és a biológiai értéke, mint a babé vagy a lencsée.

Virágzás ideje közepes (a kelést követő 35-40 napra virágzik).

Önbeporzó, de lehetséges a kölcsönös beporzás is.

Az érése korai (kb.90 nap).

A gyökere 50-60 cm mélyre hatoló, ezért a kifejlett növény szárazságtűrő.

A hektáronkénti magtermése 2-3 tonna.

Betakarításkor nem pereg.

Ne használjunk gyomirtó szert, illetve ne is ültessük olyan földbe, ahol 2 éven belül gyomirtóztak, mivel érzékeny rá.

Vízigénye csírázáskor és kezdeti növekedéskor jelentős, később öntözés nélkül is jól fejlődik.

Valamennyi esszenciális aminosavat tartalmazza.

Vetésidő: áprilisban.

Betakarítás augusztus elejére várható.

3-4 mag = 1 gramm

Ajánlott sor és tőtáv: 36 x 10 cm

Vetőmag norma: 150-180 kg/ha. (250.000mag/ha.)

(150g-180g/10m²)



P R I M A G

— 1991 —