

Lencse csávázatlan kereskedelmi

Ajánlás: abrak

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Magbélszín: sárga

Norma: 40-60 kg/ha

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: kereskedelmi



Télállóság, nagyobb termékenység, termésbiztonság

- Hazai nemesítésű, a tájkörzetbe jól illeszkedő, ott jó minőségben megtermelhető nagymagvú hüvelyes.
- Ősszel vethető fehérjenövény, gép betakarításra alkalmas fajta.
- Termesztésének számos előnye (beltartalmi paraméterek, termőképesség stb.) mellett kiemelhető, hogy a vetésére szeptember végén, október elején kerül sor, és a növény már a vetés évében megerősödik, illetve betakarítása elkerüli a nyári munkacsúcsokat, illetve a kora nyári aszályos periódusokat.
- Ebből adódóan termésbiztonsága és termőképessége is jobb a tavasszal vetett fajtáknál.
- A száraz mag színe sárga.

A lencse (*Lens culinaris*) az egyik legrégebben termesztett hüvelyes növény, amely kiemelkedő szerepet tölt be az élelmezésben és a vetésforgóban egyaránt. Kedvező agronómiai tulajdonságai és magas fehérjetartalma miatt világszerte termesztik, különösen száraz, mérsékelt és szubtrópusi éghajlatokon.

A lencse egynyári pillangós növény, amely sekély, de jól fejlett gyökérzettel rendelkezik, így kiválóan alkalmazkodik szárazabb körülményekhez is. Nitrogénkötő képességének köszönhetően javítja a talaj termékenységét, csökkentve a műtrágyaigényt a következő kultúrnövény számára. Termesztése alacsony inputigényű, hiszen mérsékelt tápanyag- és vízigényes, bár a kiegyenlített csapadékeloszlást meghálálja.

A lencse a hidegtűrő hüvelyesek közé tartozik, 4-5 °C-on csírázik, és a fiatal növények akár -5 °C-os fagyokat is elviselnek. A virágzás és hüvelyképződés szakaszában azonban érzékeny a hő- és vízhiányra, ezért megfelelő időzítéssel történő vetése kulcsfontosságú. Optimális vetésideje kora tavasszal van, amikor a talajhőmérséklet eléri a 6-8 °C-ot.

A betakarítás június végétől augusztus elejéig történik, attól függően, hogy a növény mikor éri el a teljes érettséget. A lencse hüvelyei rövid szárú száron fejlődnek, és egy-két magot tartalmaznak, ami

a betakarítás során hajlamos a pergésre, ezért a megfelelő időzítés és a helyes betakarítási technológia elengedhetetlen.

A kórokozók és kártevők közül a legnagyobb veszélyt a Fusarium fajok, a lisztharmat, valamint a levéltetvek és a bagolylepkék hernyói jelentik. A növényvédelmi beavatkozások mellett a vetésforgó helyes kialakítása segít a fertőzési nyomás csökkentésében.

A lencse termesztése nemcsak agronómiai, hanem gazdasági szempontból is előnyös, hiszen a globális piacon keresett termék, amelynek értéke az egészséges táplálkozás térnyerésével folyamatosan növekszik.

