

## Alhambra csávázatlan oltott II. fok

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan oltott

**Érésidő:** közép-késői

**Nemesítő:** Probstdorfer

**Státusz:** Előrendelhető

**Szap. fok:** II. fok



Alhambra szója fajta – közép-késői genetika kiemelkedő terméspotenciállal.

### Agronómiai jellemzők

- Éréscsoport: közép-késői 0-I (Átmenet a közép és késői fajták között), amely hosszabb tenyészidővel és stabil terméshozam-realizálással jellemezhető.
- Vetőmag szükséglet: 450-600 000 csíra/ha (rugalmas vetőmagnorma az agrotechnika és termesztési célok szerint).
- Optimális vetésidő: Április közepe – május eleje, amikor a talajhőmérséklet már stabilan meghaladja a 12 °C-ot.
- Növényfelépítés: intenzív kezdeti fejlődés, erős elágazódó képesség és gyors állományzáródás biztosítja a hatékony gyomelnyomást.
- Sortávolság: 50-75 cm-es széles sortávokra is eredményesen termesztendő, ami különösen fontos a mechanikus gyomirtás és optimális fénykihasználás szempontjából.
- Pergésre nem hajlamos: kedvező tulajdonság a késői betakarítási ablakokban, valamint a terményértékesítés során

### Gazdasági előnyök

- Magas fehérjetartalom: értékes piaci tulajdonság, amely különösen fontos az élelmiszeripari vagy takarmánycélú felhasználásnál.
- Kiemelkedő terméspotenciál: hosszabb tenyészidőszakban is stabil hozamhoz vezet.
- Széles vetési ablak: rugalmas vetésidő és alkalmazkodás a regionális éghajlati viszonyokhoz.
- Pergésmentesség: csökkenti a takarmány- és terményértékesítési kockázatokat.

### Alhambra ideális választás azon szója termesztők számára, akik

- stabil genetikai háttérrel rendelkező közép-késői fajtát keresnek;
- magas hozam- és minőségi potenciált szeretnének elérni;
- kiemelt figyelmet fordítanak a fehérjetartalom optimalizálására;
- olyan genetika mellett döntenek, amely száraz és stresszes körülmények között is bizonyított.



P R I M A G  
— 1991 —