

Ananda csávázott oltott I. fok


Csávázás: csávázott oltott

Érésidő: középkorai

Nemesítő: Saaten Union

Státusz: Elfogyott

Szap. fok: I. fok

- 
- (0/I) korai fajták érésideje a közép érésűek kimagasló terméspotenciálja
 - az ország valamennyi termőtaján megállja a helyét
 - homogén növényállomány, egyenletes virágzás és érés
 - kifejezetten jó állóképesség, biztonságos betakaríthatóság

Az ANANDA fajta figyelemre méltó újdonságát jól jelzi, hogy fajtajelöltként a NÉBIH szója fajtakísérleti rendszerét a korai (0) éréscsoportban kimagasló eredménnyel zárta.

A fajta eredményeit meghatározó agronómiai tulajdonságok alapján tehát kijelenthető, hogy egy olyan új fajta született az ANANDA esetében, amely a korai fajták érésidejével rendelkezik ugyan, de a középérésűek kimagasló termőképességét hordozza magában. Ezzel az ország valamennyi termőtaján biztonsággal termesztendő fajtaként számíthatunk teljesítményére.

Az elmúlt tenyészidőszakban végzett termékfejlesztési- és üzemi kísérleteink eredményei, továbbá országos viszonylatban is számos helyszínről begyűjtött megfigyeléseink is alátámasztják, hogy a fajta sikerességének záloga a jellemzően ütemes fejlődési dinamikának és az egészséges- gyorsan záródó növényeknek köszönhető.

A kimagasló termőképességben, az ANANDA generatív habitusának, a fajta kiváló állóképességének, a pergéstől és betakarítási veszteségektől mentesen kezelhető állománynak meghatározó szerepe van. Az ANANDA állományát közepesen magas (95-105 cm) rövid szárközű, mérsékelt elágazási hajlamú ún. féldeterminált fejlődési típusú, lila virágokkal később pedig hüvelyekkel gazdagon berakódott növények jellemzik. Levélzete haragoszöld- és egészséges, a tenyészidő végeztével egyenletesen leszáradó. Ezzel biztosítva az átlagosan 165-195 grammos ezerszem tömegű, világos barna köldökű szemek zavartalan kitelítődését és a takarmányozási szempontból meghatározó beltartalom mutatóinak kedvező alakulását.

Termesztését a növények jó kompenzációs habitusából adódóan a dupla gabona (25,0 cm), cukorrépa (45,0-50,0 cm) és akár kukorica (75,0 cm) sortávon 55-60 mag/m² megvalósított vetésekben javasoljuk.

Jellemzői

- Növekedés típusa féldeterminált (kompenzációs)
- Éréscsoport középkorai
- Tenyészidő 128 -135 nap
- Ezermagtömeg 165 - 195 gramm

- Javasolt tőszám 400.000-450.000 csíra/ha
- Javasolt sortáv 25 - 45 cm (75 cm)
- Javasolt vetési idő 04.15. -05.10.
- Fehérjetartalom 32-35%
- Olajtartalom 20- 23%



P R I M A G

— 1 9 9 1 —