

## Iregi szürke csíkos csávázatlan

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan


**Érésidő:** igen korai

**Nemesítő:** Kaposvár

**Státusz:** Rendelhető

**Típus :** csíkos/madáreleség/ bióban is

**Védekezés:** hagyományos



Elsősorban madáreleségként javasolt a termesztése, de étkezési célra is termelhető, alkalmas biotermesztésre is.

Ezerkaszat tömege étkezési termelésnél 50-65 gr, bélaránya 70-75%, fehérjetartalma 19-21%, olajtartalma 32-34%.

A legfontosabb napraforgó betegségekkel szemben toleráns.

Gyommentes állomány esetén nem mindig szükséges a deszikkálás.

- Javasolt tápanyagellátás 350 kg összhatóanyag tartalmú 1:2:2 NPK arányú műtrágya hektáronként.
- Vegyszerérzékenység az engedélyezett vegyszerekkel szemben nincs.
- Üzemi viszonyok között a termőképessége 2,5-3,0 t/ha.
- Átlagos magassága 150-160 cm.
- Tenyészideje 116-118 nap.
- Kaszat mérete: 8-11 mm

### Javasolt tőszám:

- madáreleség termelésnél 60.000-65.000 tő/ha
- étkezési célra történő termelés esetén 50.000-55.000 tő/ha

### AKÁR zöldítésben is...

A napraforgó bár jelenleg nem szerepel a zöldítésre engedélyezett növényfajok hivatalos listáján Magyarországon. Így önállóan nem használható sem ökológiai jelentőségű másodvetésként, sem zöldtrágyaként a zöldítési követelmények teljesítésére.

Azonban bizonyos takarónövény-keverékekben kis arányban előfordulhat, például biomassa-növelés céljából. Ilyen esetekben is fontos, hogy a keverék megfeleljen a vonatkozó előírásoknak, és a napraforgó aránya ne haladja meg a megengedett mértéket.

- Napraforgó önállóan: nem támogatható zöldítés céljára.
- Napraforgó keverékben: csak kis arányban, más engedélyezett fajokkal együtt, a hivatalos fajlistának megfelelően.



P R I M A G

— 1991 —