

Sibemol csávázatlan II. fok

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Jellemző: kékvirágú/ bióban is

Státusz: Ajánlatkérés

Szap. fok: II. fok

SIBEMOL lucerna - a hozam maximalista

Erősségei

- Magas hozam minden kaszálásnál
- Rendkívüli betegség és kártevő ellenálló képesség
- Kiváló hektáronkénti fehérjehozam

Agronómiai tulajdonságai

- Típus: Flamand - hidegtűrő
- tartósság: 4 év
- Tolerancia: fonálféreg
- Szárszilárdság: 1-9 skálán 6,6
- Fakadási erély: 1-9 skálán 6,1
- Fenésedés ellenállóképesség: 1-9 skálán 8,5
- Fonálféreg ellenállóképesség: 1-9 skálán 7,6
- Szárazanyaghozam: 2. & 3. évben 16,6 t/ha/év
- Teljes nitrogén tartalom: 19,4%
- Emészthetőség: 31,2% (ADF tartalom arányában)

Jellemzői és felhasználása

- A SIBEMOL lucerna kiváló terméshozamot biztosít kiemelkedő fehérjetartalommal.
- Önálló kultúraként is kiválóan termesztethető, de egyéb fűfélékkel társítva (pl. csomós ebír, nádképű csenkesz) további termésátlag növekedés érhető el.
- Aprómorzsás talajelőkészítést igényel. A gyommentes talajállapot elérése érdekében többszöri gyomirtás szükséges. A vetőágy legyen tömörödött és apró szerkezetű, lehetővé téve a talaj-mag megfelelő kapcsolatát
- Vetéskor ügyelni kell a vetőgép megfelelő beállítására a kívánt sűrűség elérése érdekében. Keverék vetése esetében meg kell győződni a keverék homogenitásáról, maximum 0,5 cm mélyen kell vetni és ezt követően hengerezni szükséges.
- Növényvédelem során fontos ellenőrizni a csiga populációt és szükség esetén gyéríteni azt. Négy leveles állapottól kell gyomírtani a lucernát, biztosítva vele a terméspotenciált, a minőséget és a hosszú fenntarthatóságot. Fontos figyelemmel kísérni az esetleges

rovarkártevők fejlődését és szükség esetén be kell avatkozni rovarölőszerek alkalmazásával.



P R I M A G
— 1991 —