

## Viktória csávázatlan II. fok

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Jellemző:** intenzív/ kékvirágú

**Státusz:** Rendelhető

**Szap. fok:** II. fok

A termesztési ciklusban mind a 30, mind a 40 naponkénti kaszálási rendszerben több szárazanyag termést adott, mint a standard fajták átlaga.

Hozamkiegyenlítetttsége, szárszilárdsága, tél és fagyállósága jó.

A fajta szárazanyag termése a különböző termőhelyeken és években a kaszálások többségében több mint a standard fajták termésátlaga.

Az egyes években és a négy éves ciklus alatt elért szárazanyagtermés a kísérleti helyek átlagában mindkét kaszálási rendszerben meghaladja a standard fajták teljesítményét.

A termesztési ciklusban a standardokhoz viszonyítva a 40 napos kaszálás mellett ért el jobb eredményt.

Kaszálásonkénti és évenkénti hozamkiegyenlítetttsége jó, a 3. és 4. évben is többet termelt, mint a standardok.

Termesztése valamennyi lucerna termőterületére ajánlott, az intenzív termesztési feltételekre nagy terméssel reagál közepesen kötött és kötött talajokon egyaránt.

### Vetés/vetésidő

- Vetésmélység: **az optimális érték 0,5-1 cm**, de legfeljebb 1,5 cm!
- Lucernavetés vetőmagszükséglet tavasszal vagy ősszel : 25-35 kg/ha
- Keverten 15-20 kg/ha lucernamag vethető 15-20 kg/ha csenkessel vagy egyéb fűfélével.

### Vetőmag normája

- **zöldtakarmánynak, silónak:** 20-25 kg/ha
- **szénának, szenázsnak, pelletnek:** 25-30 kg/ha