

Karcagi kismagvú csávázatlan kereskedelmi

Ajánlás: abrak/ zöldtakarmány

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 180-220 kg/ha

Státusz: Rendelhető

- Érett magjáért, esetleg zöldtakarmánynak termesztjük.
- Szalmája értékes takarmány.
- Kitűnő búza-elővetemény.
- A gyengébb szikes területek hüvelyes növénye.
- Elsősorban zöldtrágyázásra, zöldtakarmányozásra, szénakészítésre nemesített fajta.
- A gyökérzetén lévő nitrogényűjtő baktériumok hektáronként 50-70 kg nitrogénnel gazdagítják a talajt, a bedolgozott szervesanyag javítja a talaj szerkezetét.
- Természtése: szórványosan az ország szárazabb, aszályosabb vidéke, elsősorban a Tiszántúl.
- Elő- és utóveteménye: a borsóéval azonos
- Trágyázása: 1 : 2 : 2 arányban N-P-K műtrágyát igényel.
- Talaj-előkészítése: A borsóéval azonos. Mivel gyakrabban termesztjük sekély termőrétegű talajon, ezért az altalajlazítás termés-fokozólag hathat.
- Vetés: Korán, március elején tisztán, támasztónövény nélkül vessük, mert ez növeli a terméshozadékot. Gyommentes területen gabona-sortávolságra vethető, illetve ha a terület vegyszeres gyomirtása megoldott, szintén. Ellenkező esetben elgyomosodik. Vetésmélysége 4-8 cm. Magtakarásra fogas+hengert használunk. Növényápolása: vegyszeres gyomirtása a borsóéhoz hasonló.
- Csávázni nem kell.
- Mivel a csírázáshoz több nedvességet igényel, mint a többi hüvelyes, amint a talajra lehet menni, vetni kell. Fontos az egyenletes vetésmélység, nedves talajban 5-6 cm, míg kiszáradt talajban vetésmélységtől függetlenül - a nedves rétegig le kell tenni a magot.
- A lednek termésmennyiségét a növényállomány sűrűsége döntően befolyásolja. Tisztavetésben gabonasortávolságra vetve (12-15 cm) 1,0-1,2 millió csíra/ha indokolt.
- Betakarítása: A búzával azonos időben, a borsóhoz hasonlóan takarítható be. A magvak alulról felfelé haladva érnek. Akkor arassuk, amikor a legértékesebb magvak már beértek. A borsóhoz viszonyítva a hüvelyek kevésbé nyílnak fel. Zöldtakarmánynak májusban júniusban takarítjuk be, amikor az alsó hüvelyekben a magvak már közel viaszérettek.
- Termése: A 10-17 q/ha közepes termésnek számít. A jobb terméseredmény 20 q/ha felett van.
- A szalmatermés a szemtermés kétszerese. Zöldtakarmányból 150-200q/ha termést ad. Ennek a tápértéke jobb, mint a borsóé.
- 1000magsúlya: 160-180 g, Hektolitersúlya: 70-90 kg.



P R I M A G
— 1991 —