Tarka koronafürt csávázatlan

Ajánlás: zöldugar/ méhlegelő

Csávázás: csávázatlan

Életciklus: évelő

Norma: 15-20 kg/ha

Státusz: Előrendelhető

Szap. fok: kereskedelmi

A tarka koronafürt (Securigera varia) a pillangósvirágúak családjába tartozó szálas takarmány növényfaj. Száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek jellemző növénye. 30–120 cm magas vagy hosszú kúszó, évelő növény. Élettartama 4–6 év. Szára szögletes, kopasz vagy gyéren szőrös. Levelei elliptikusak, egyszeresen szárnyaltak, a levélkék rövid nyelűek. Fürtös virágzata füzérformájú. Lassú növekedésű, talaj iránt nem érzékeny, de a meszes talajokat kedveli. Kisebb tápanyagigénye van, mint a lucernánál. A tarka koronafürt (Securigera varia, korábban Coronilla varia) egy évelő pillangós növény, amely elsősorban takarmányként és talajjavító célokra ismert. Eurázsia mérsékelt égövi területein őshonos, de elterjedt Észak-Amerikában is, ahol talajmegkötő tulajdonságai miatt telepítették.

Botanikai szempontból a tarka koronafürt erőteljes tarackoló gyökérzettel rendelkezik, amely elősegíti a talaj stabilizálását, megakadályozva az eróziót. Szára 30-90 cm hosszú, hajtásai legyökerezhetnek, így sűrű állományt képez. Öt-hétszálas összetett levelei jellegzetes pillangós morfológiájúak. Virágzata bogernyő, rózsaszínes-lilás, néha fehér vagy sárgás árnyalatokkal. A virágzás júniustól szeptemberig tart, mely időszak alatt fontos nektárforrás a méhek és más beporzók számára.

A tarka koronafürt kiváló szárazságtűrő, gyenge termőképességű talajokon is jól fejlődik. Nitrogénkötő képessége révén gazdagítja a talajt, így előveteményként vagy zöldtrágyaként is alkalmazható. Magról és vegetatívan egyaránt jól szaporítható, azonban invazív hajlama miatt bizonyos régiókban korlátozzák a termesztését.

A takarmányozásban elsősorban legelőként vagy kaszálva alkalmazzák, de mérsékelt toxikussága miatt óvatosság szükséges: nagy mennyiségben fogyasztva kumarinszármazékokat tartalmaz, amelyek egészségkárosító hatásúak lehetnek.

Őshonos, lágy szárú, 30–120 cm magas vagy hosszú kúszó, évelő növény. Élettartama 4–6 év. Szárazságtűrő és télálló. A kérődzőkre egyáltalán nem mérgező, legeltethető juhokkal, kecskékkel és marhákkal. Tűri a rágást, tiprást és nem okoz felfúvódást.

Szára szögletes, kopasz vagy gyéren szőrös. Levelei elliptikusak, egyszeresen szárnyaltak, a levélkék rövid nyelűek. Fürtös virágzata füzér formájú. A virágok levélhónaljiernyőben állnak, hosszú kocsányúak, egy virágzatban 12-22 virággal.

Májustól novemberig virágzik. Termése befűzött hüvely, nem felnyíló, cikkelyekre esik szét.

Lassú növekedésű. Talaj iránt nem érzékeny, de a meszes talajokat kedveli, a szárazságot jól, de a pangóvizet rosszul tűri. Tápanyagigénye kisebb a lucernánál.

Értékes takarmánynövény a növény gyengébb talajokon is 5–6 t/ha/év/1szénatermést adhat a lucernával azonos vagy hasonló nyersfehérje-és nyersrost-tartalommal. Hátránya hogy az első évben nem ad kielégítő termést, mert a kezdeti fejlődése lassú. Kelése kb. egy hónapot vesz igénybe, ugyanakkor kiváló nyári legelő, amikor a gyepek már kiégtek. Toxikus β-nitro-propionsavattartalmaz, amely azonban a kérődzők bendőjében elbomlik. Enyhén mérgező!

Betegségei és kártevői gyakorlatilag nincsenek, az aranka nem támadja meg.

A házi méhek is szeretik látogatni, megtermékenyítik.

A tarka koronafürt (Securigera varia) vetőmagnormája 10-20 kg/ha, attól függően, hogy milyen célból vetik:

- Zöldtrágya vagy talajjavítás céljából: általában 15-20 kg/ha szükséges, hogy sűrű állomány alakuljon ki, ami hatékonyan köt meg nitrogént és védi a talajt.
- Legelő vagy kaszáló céljára: 10-15 kg/ha, mivel ritkább állomány is elegendő a megfelelő fűhozamhoz és a többi takarmánynövénnyel való keveredéshez.

A vetés mélysége 1-2 cm, és ajánlott tavasszal vagy kora ősszel vetni. A csírázás elősegítése érdekében ajánlott a magokat előzetesen mechanikusan megkarcolni vagy oltani nitrogénkötő baktériummal.

PRIMAG
1991