

## **Cikória csávázatlan**

**Ajánlás:** intenzív legeltetés

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Jellemző:** szárazságtűrés

**Norma:** 4-8 kg/ha

**Státusz:** Rendelhető

**Vetésidő:** tavasz



P R I M A G

— 1991 —



### **Szárazságnak kitett legelők szárazságtűrő komponense!**

Az Új-Zélandi nemesítésnek köszönhetően nagyobb levelű, mint a hazánkban is őshonos alaptípusok. Ismert erénye, hogy gazdag tanninokban, azaz csersavakban. Ezeknek az egyik haszna, hogy a zöldtakarmányokban lévő fehérjék egy részét „védetté” teszik a bendőbaktériumok lebontó hatásától távol, a bélben kerülnek lebontásra.

Gyakran vegyesen termesztik legeltetésre, általában fű- pillangós keverékekkel együtt, tavasszal, vagy augusztus-szeptemberben vetve. Az ilyen vegyes legelő akkor is zöld marad, amikor a klasszikus fű-pillangós keverék már szenved.

A cikória nagyon jó étrendi hatású, nem felfújó, és tejképző hatású takarmány. Legjobb kihasználási formájában gyors legeltetési ciklusokkal, akár 15-20 naponta legeltethető. Nagy és zseme levelei hasonlóak a tavaszi friss gypéhez. Mély, és mindig aktív gyökérzetének köszönhetően a levelek mikroelemtartalma is nagyon kedvező. Kedvező hatásai közé tartozik a csersavtartalmának köszönhető parazitaölő (bélfertőtlenítő) hatása, és a mély gyökérzetének köszönhető talajlazító

hatás.

A cikória könnyen kombinálható a tanninokban gazdag [útifűvel](#).



P R I M A G

— 1991 —