

Takarmányrépa

A speciális kultúrák vetőmagjai olyan alternatív növényfajokat foglalnak magukba, amelyek nem sorolhatók a klasszikus fűfélék, pillangósok vagy takarmánykeverékek közé, mégis kiemelt szerepet töltenek be a korszerű takarmányozásban és vetésforgó-tervezésben. Ebben a kategóriában olyan vetőmagokat találsz, amelyek egyedi agronómiai tulajdonságaik és speciális felhasználhatóságuk miatt külön kezelést igényelnek. A speciális növények – például a takarmányrépa, takarmány sárgarépa vagy takarmánycélú cukorrépa – magas hozamú, energiadús takarmányforrások, amelyek kiválóan beilleszthetők intenzív és extenzív állattartó rendszerekbe egyaránt.

Speciális kultúrák, alternatív megoldások 1 helyen.

Termék	STÁTUSZ	KISZERELÉS	NETTÓ EGYSÉGÁR
Béta vöröshenger I. fok csávázatlan	Rendelhető	1 kg/zsák	3 055 Ft/kg
Jaune du Doubs standard konstans fajta csávázatlan	Rendelhető	1 kg/zsák	18 702 Ft/kg
Lobbericher standard konstans fajta csávázatlan	Rendelhető	1 kg/zsák	18 702 Ft/kg
Rózsaszínű béta elit csávázatlan	Rendelhető	1 kg/zsák	3 055 Ft/kg
Jamon I. fok csávázatlan	Előrendelhető	50 ezer szem/csomag	

Ha stabil, nagy energiatartalmú gyökértakarmányt szeretnél beilleszteni a vetésforgóba, a takarmányrépa kiváló választás. A faj a Beta vulgaris csoportjába tartozik, de a cukorrépától eltérően elsősorban tömegtakarmány-előállításra nemesítették. Gumója nagy méretű, gyakran részben a talajfelszín fölé emelkedik, színe fajtától függően sárga, narancs vagy vörös árnyalatú lehet.

Agronómiai jellemzők

- Vetésidő: március közepe – április eleje, 6–8 °C talajhőmérséklettől
- Vetőmagnorma: 80–120 ezer csíra/ha (fajtától és sortávától függően)
- Sortáv: 45–50 cm
- Tenyészidő: 170–200 nap
- Terméspotenciál: 80–120 t/ha gyökértömeg
- Szárazanyag-tartalom: 12–18%
- Felhasználás: friss etetés, szeletelve, silózva vagy keveréktakarmányban

Takarmányozási előnyök

A gumó magas víztartalma mellett könnyen emészthető szénhidrátokat biztosít, így növeli a napi takarmányfelvételt és javítja a bendőműködést. Tejelő szarvasmarhánál hozzájárulhat a tejtermelés stabilizálásához, hizlalásban pedig az energiapótlás hatékony eszköze lehet.

Fontos, hogy etetés előtt fokozatos hozzászoktatást alkalmazz, és a takarmányrétát strukturális rostforrással kombináld.

Vetésforgóban betöltött szerepe

Kapásnövényként jól illeszthető gabona- és takarmánynövények közé. Jó előveteménye az őszi [kalászosoknak](#), mivel korai betakarítása után megfelelő talajállapot alakítható ki. Betegségmegelőzés miatt 4 éves visszatérési idő javasolt.

Miért gyűjtőkategória?

A speciális kultúrák kategória egy tudatosan kialakított gyűjtőfelület, amely azokat az alternatív növényfajokat fogja össze, amelyek jelenleg nem illeszthetők be egyértelműen a meglévő vetőmag kategóriákba. Célja, hogy egy helyen, átlátható módon tud elérni ezeket az újdonságokat, miközben a kínálat a jövőben tovább bővíthető és finomítható.

PRIMAG
— 1991 —