Rózsaszínű béta elit csávázatlan

Ajánlás: tömegtakarmány

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Jellemző: nagy hozam

Norma: 10-15 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Vetésidő: tavasz

A Rózsaszínű Béta takarmányrépa egy jól bevált, könnyen kezelhető gyökértakarmány fajta, amelyet elsősorban jó ízletessége és egyszerű betakaríthatósága miatt választanak az állattartók. Gumója világos rózsaszínes színű, általában részben a talajfelszín felett fejlődik, így kézi és gépi felszedésre egyaránt alkalmas. Ideális megoldás, ha jól hasznosuló, energiadús takarmányt szeretnél beilleszteni a napi adagba.

Főbb agronómiai jellemzők

- Faj: Beta vulgaris var. crassa
- Típus: gömbölyded vagy tojásdad gumó
- Gumó színe: rózsaszínes héj, világos belső
- Elhelyezkedés: jelentős része a talajfelszín felett
- Vetésidő: március közepe – április eleje
- Vetőmagnorma: 80–120 ezer csíra/ha
- Sortáv: 45–50 cm
- Tenyészidő: 170–200 nap
- Terméspotenciál: 70–100 t/ha
- Szárazanyag-tartalom: 12–16%

A fajta jól alkalmazkodik a különböző talajtípusokhoz, de legjobb eredményt középkötött, jó vízgazdálkodású talajokon ad. A megfelelő tápanyagellátás – különösen a kálium – hozzájárul a gumóméret és a beltartalom növeléséhez. A felszíni gumóelhelyezkedés miatt szárazabb körülmények között is könnyebben betakarítható.

Termesztési előnyök

A Rózsaszínű Béta egyik legnagyobb előnye a könnyű felszedhetőség, ami csökkenti a betakarítási költségeket és munkaidőt. Különösen előnyös kisebb gazdaságokban vagy ott, ahol részben kézi betakarítás történik.

A fajta:

- gyorsan fejlődő, jól induló állományt ad
- kiváló ízletességű takarmányt biztosít
- jól kombinálható más takarmányokkal
- rugalmasan felhasználható különböző tartási rendszerekben

Takarmányozási felhasználás

A Rózsaszínű Béta takarmányrépa kifejezetten jó ízletességű, ezért növeli az állatok takarmányfelvételét. Magas víztartalma mellett könnyen emészthető szénhidrátokat biztosít, így hatékony energiapótló.

Felhasználása:

- tejelő és húshasznú szarvasmarha
- juh és kecske
- kiegészítő takarmányként más tömegtakarmányok mellett

Etetéskor javasolt fokozatos hozzászoktatás, valamint rostforrásokkal történő kombinálás a kiegyensúlyozott takarmányadag érdekében.

Vetésforgóban betöltött szerepe

Kapásnövényként jól illeszthető a vetésforgóba, különösen gabonafélék elé. Talajlazító hatása és korai betakaríthatósága miatt kedvező elővetemény lehet. A betegségek megelőzése érdekében 3–4 éves visszatérési idő ajánlott.

PRIMAG
1991